



ぶどう特報 #7



2023年6月15日
JA 中野市園芸課
JA 中野市ぶどう部会

年度	巨峰開花	巨峰満開	シャイン開花	シャイン満開	特記
平年	6/5	6/9	6/10	6/15	過去10年平均値 (H25~R4)
2022年 (R4)	6/10	6/11	6/15	6/18	生育停滞により開花平年より遅れる
2023年 (R5)	6/7	6/10	6/14頃	6/17頃	巨峰：平年比+2日、シャイン：昨年並み

*観測地：平岡

- ◆ 水まわり期（ベレーゾン）：果粒が軟化し弾力が出てくる時期を指す。黒系品種では着色始期。
満開 40~45日頃 ⇒ 巨峰系：7/20~7/25頃 シャインマスカット：7/27~8/2頃
ベレーゾン直前の枝管理注意点：シャインマスカット等の縮果症防止のため、過度な枝管理（強摘芯等）は控えてください。

【7月上旬の定期散布 *共通】

散布時期	落花 20 日後	品種名：_____
		散布日：7月 _____ 日
		散布量：_____ ℓ
散布薬剤	水	100ℓ
	レーバスフロアブル	50 ml (7 日前・3 回)
	アミスター10 フロアブル	100 ml (30 日前・3 回)
	カナメフロアブル	25 ml (前日・3 回)
	ディアナ WDG	10g (前日・2 回)
散布量	400ℓ/10a	品種名：_____
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、灰色かび病、褐斑病、アザミウマ類、クビアカスカシバ 他	散布日：7月 _____ 日
注意事項	① 雨よけ栽培、露地（巨峰・ナガノパープル・ピオーネ等）の品種はカナメフロアブルを加用しなくてもよい。 ② 【在庫整理】レーバスフロアブルに代えて、ザンプロ DM フロアブル 2,000 倍（30 日前・2 回）を使用してもよい。※ただし、農薬汚れ（果粉溶脱）に注意する。	散布量：_____ ℓ

8月上旬に栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報に散布日・散布量を記録し、保管してください。

今年の房作りについて

今年はシャインマスカットを中心に房型が悪い傾向にあります。主穂を長めに房切りした方は早期に段調整や予備摘粒を行いましょ。また未開花で主穂先端が咲かない場合は満開のタイミングを逃さないように気を付けましょ。

- ・ジベ処理後は、新梢管理・こまめなかん水を行い、養分がなるべく房に集中するように管理する。
- ・ジベ処理後、葉色が薄い場合があれば、担当技術員に相談する。（追肥等）
- ・2回目ジベ処理後は軸が硬くなるので、早期に摘粒・袋掛け作業に入る。
- ・ジベ処理後は、生育の遅れた新梢や肥大・房型が悪い房を中心に摘房を行い、適正着果量を守りましょ。（4新梢に3房） ※下図参照

品種	作型	着果重量 (10a あたり)	着果目安		
			粒数	長梢	短梢
シャインマスカット (1房 500g)	露地	1,700kg	35粒まで (1粒 15g)	32房/10㎡	16房/2m
クイーンルージュ® (1房 500g~550g)	露地	1,400 kg	35粒まで (1粒 15g)	27房/10㎡	13房/2m
種なしぶどう (1房 420g)	露地	1,600kg	30粒 (1粒 14g)	38房/10㎡	19房/2m

- ・梅雨時期は10日間隔の防除を徹底し、散布死角のないように丁寧に散布する。

特報#8 6/30付け発行予定。落花30日・袋掛け直後の定期散布等記載予定