



ぶどう特報 #8



2023年7月3日
JA 中野市園芸課
JA 中野市ぶどう部会

- ◆ 巨峰：開花 6/7、満開 6/10、落花 6/13 シヤイン：開花 6/13、満開 6/17、落花 6/19
- ◆ 1 回目のジベ処理から概ね 10 日後～2 週間のうちにジベ処理 2 回目を実施する。
- ◆ 水まわり期（ベレーゾン）：果粒が軟化し弾力が出てくる時期を指す。黒系品種では着色始期。
満開 35～45 日頃 ⇒ 巨峰系：7/20～25 頃 シヤインマスカット：7/27～8/2 頃
- ◆ ベレーゾン直前の枝管理注意点：シヤインマスカット等の縮果症防止のため、過度な枝管理（強摘芯等）は控えてください。
- ◆ 露地収穫解禁予定：ナガノパープル 8/30、巨峰 8/30、種なし巨峰 9/6、シヤインマスカット 9/21、クイーンルージュ®9/27 *概ねの解禁予定です。気象条件等で前後する場合があります。

【7月中旬の定期散布 *共通】		品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ	品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ
散布時期	落花 30 日後		
散布薬剤	水	100ℓ	
	ライメイフロアブル	25 ml (14 日前・3 回)	品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ
	オンリーワンフロアブル	50 ml (前日・3 回)	
	アーデントフロアブル	50 ml (前日・4 回)	
散布量	400ℓ/10a		
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、灰色かび病、褐斑病、アザミウマ類、コガネムシ類、ハダニ類 他		
注意事項	① 袋掛け直前の散布とする。 ② クイーンルージュ®晩腐病・黒とう病強化対策：オンリーワンフロアブルに代えて、ミギワ 20 フロアブル 2,000 倍を（前日、3 回）を使用する。		

【7月下旬の定期散布 *共通】		品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ	品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ
散布時期	袋掛け直後		
散布薬剤	水	100ℓ	
	アビオン-E (展着剤)	50 ml	品種名： _____ 散布日： ____月 ____日 散布量： _____ℓ
	ムッシュボルドーDF	200g (一・一)	
	アルバリン顆粒水溶剤	50g (前日・3 回)	
散布量	400ℓ/10a		
適用病害虫	べと病、さび病、ブドウトラカミキリ、カメムシ類、クビアカスカシバ、チャノキイロアザミウマ、コナカイガラムシ類 他		
注意事項	① 【ハダニ類対策】コロマイト水和剤 2,000 倍（7 日前、2 回）を加用する。 ② 【クビアカスカシバ対策】劇パダン SG 水溶剤 1,500 倍（21 日前、5 回）を加用する。 ③ 【代替】アビオン-E に代えて、K・K ステッカー 3,000 倍でもよい。尚、K・K ステッカーを使用する場合、調合は最後とする。 ④ ムッシュボルドーを使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。		

特報 #9 8/1 付け発行予定。8 月中旬・下旬定期散布記載予定。