

もも・ネクタリン特報

No. ⑥

2021. 5. 17

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

この特報は、4/30 発行の「もも・ネクタリン特報No.⑤」の薬剤散布（散布目安は、5/10～17 頃）が終わってから行なう防除を掲載しています。特報No.⑤の内容を再度、ご確認ください。

本年は、凍霜害被害により結実不良園が散見されています。管理作業などについては、5/17 同日配布のもも・ネクタリン特報号外・凍霜害対策特報をご覧ください。

ネクタリンの定期散布については、次面をご覧ください。

もも

第6回 定期散布

散布時期 5 月下旬 （第5回 定期散布から 10 日後）

・散布日の目安：5 月 20 日～5 月 30 日

散布薬剤 水 100 リットル当り

アビオン E（展着剤）	100 ml	
アルバリン顆粒水溶剤	50 g	（収穫前日まで、3 回以内）
トレノックスフロアブル	200 ml	（収穫 7 日前まで、5 回以内）
マイコシールド	66 g	（収穫 21 日前まで、5 回以内）

散布量 10 アール当り 500 リットル

対象病害虫 せん孔細菌病、黒星病、灰星病、モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類

散布日 5 月 日

散布量 リットル

もも特別散布

散布時期 6 月上旬 （第6回 定期散布から 7～10 日後）

・散布日の目安：6 月 1 日～10 日

散布薬剤 水 100 リットル当り

アビオン E（展着剤）	100 ml	
マイコシールド	66 g	（収穫 21 日前まで、5 回以内）

散布量 10 アール当り 500 リットル

対象病害虫 せん孔細菌病

散布日 6 月 日

散布量 リットル

第7回 定期散布

散布時期 6 月上旬 （第6回 定期散布から 14 日後）

・散布日の目安：6 月 5 日～6 月 15 日

散布薬剤 水 100 リットル当り

アビオン E（展着剤）	100 ml	
デランフロアブル	166 ml	（収穫 7 日前まで、4 回以内）
⑧ ダーズバン DF	33 g	（収穫 14 日前まで、5 回以内）
マイコシールド	66 g	（収穫 21 日前まで、5 回以内）

散布量 10 アール当り 500 リットル

対象病害虫 せん孔細菌病、黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ウメシロカイガラムシ

注意事項 ①カメムシ類対策：スミチオン水和剤 40 の 1,000 倍（3 日前、6 回）を加用する。

散布日 6 月 日

散布量 リットル

ネクタリン

第6回 定期散布

散布時期	5月下旬（第5回 定期散布から10日後） ・散布日の目安：5月20日～5月30日	散布日 5月 日 散布量 リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り アビオンE（展着剤） 100ml アルバリン顆粒水溶剤 50g（収穫前日まで、3回以内） トレノックスフロアブル 200ml（収穫30日前まで、5回以内） マイコシールド 66g（収穫28日前まで、5回以内）	
散布量	10アール当り 500ℓ	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、シンクイムシ類、モモハモグリガ、アブラムシ類、カメムシ類	

第7回 定期散布

散布時期	6月上旬（第6回 定期散布から14日後） ・散布日の目安：6月5日～6月15日	散布日 6月 日 散布量 リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り アビオンE（展着剤） 100ml デランフロアブル 166ml（収穫14日前まで、2回以内） 劇ダーズバンDF 33g（収穫14日前まで、2回以内） スターナ水和剤 100g（収穫7日前まで、3回以内）	
散布量	10アール当り 500ℓ	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、ハマキムシ類	
注意事項	せん孔細菌病対策：スターナ水和剤に代えてマイコシールドの1,500倍（28日前、5回）を使用する。	

「せん孔細菌病」春型枝病斑除去 強化週間

期間：5月17日（月） ～ 5月28日（金）

「せん孔細菌病」春型枝病斑が散見されています。そのため、昨年引き続き枝病斑切除の強化週間を設定いたしました。

もも・ネクタリン栽培者の方におかれましては、作業のお忙しい中ですが枝病斑切除を行ってください。

切除方法・・・枝病斑よりも基部の健全な芽を3～4芽含んで切除する。

