

# サクランボ特報 No. 4

J A 中野市営農センター  
J A 中野市サクランボ部会

生育は4月下旬の気温（平年比-1.3℃）により、やや遅延ぎみに進んでいますが、開花期間が長くバラつきが見られます。凍霜害による花器異常で結実不良の被害が見られます。結実不良の園地は、摘果を行わず着果量を確保するよう努めて下さい。また、次年度の花芽充実のため新梢管理を実施し、樹冠内の明るさを確保して下さい。

収穫開始期は「香夏錦・高砂」が6月5日～10日頃、「佐藤錦」が6月10日～15日頃と予想されます。  
定期防除・管理作業は遅れないよう計画的に実施しましょう。

## 第5回 定期散布

|     |    |      |
|-----|----|------|
| 散布日 | 6月 | 日    |
| 散布量 |    | リットル |

**散布時期** 6月上旬（散布日の目安：6月1日～5日）  
\*第4回 定期散布から14日後

|             |         |        |               |
|-------------|---------|--------|---------------|
| <b>散布薬剤</b> | 水       | 100ℓ当り |               |
|             | ナリアWDG  | 50g    | （収穫前日まで、3回以内） |
|             | ディアナWDG | 10g    | （収穫前日まで、2回以内） |

**散布量** 10アール当り 500ℓ

**混用順** 水 ⇒ ナリアWDG ⇒ ディアナWDG

**対象病害虫** 灰星病、炭そ病、幼果菌核病、褐色せん孔病、黒斑病、オウトウショウジョウバエ、ハマキムシ類

### 【注意事項】

- ① 展着剤は加用しない
- ② 【代替】ナリアWDGに代えてフルーツセイバー1,500倍（前日、3回）を使用してもよい。

## 第6回 定期散布（**紅秀峰、紅きらり**等の最終防除）

|     |    |      |
|-----|----|------|
| 散布日 | 6月 | 日    |
| 散布量 |    | リットル |

**散布時期** 6月中旬（散布日の目安：6月14日～18日）  
\*第5回 定期散布から14日後

|             |             |        |               |
|-------------|-------------|--------|---------------|
| <b>散布薬剤</b> | 水           | 100ℓ当り |               |
|             | オンリーワンフロアブル | 50ml   | （収穫前日まで、3回以内） |
|             | コルト顆粒水和剤    | 10g    | （収穫前日まで、3回以内） |

**散布量** 10アール当り 500ℓ

**混用順** 水 ⇒ オンリーワンフロアブル ⇒ コルト顆粒水和剤

**対象病害虫** 灰星病、幼果菌核病、褐色せん孔病、黒斑病、オウトウショウジョウバエ

【注意事項】 展着剤は加用しない。栽培日誌の完全記帳、出荷時まで提出をお願いします

次頁もご覧ください。

## ●着色管理

- (1) 摘芯・誘引を実施して、下垂している結果枝は支柱や枝つりをする
- (2) 葉摘み
  - ・収穫予定の7～10日前頃から行い、果実に直接覆いかぶさる葉を摘み取る
  - ・摘み取る葉数は、果そう葉の3分の1程度を限度に、できるだけ少なめにとどめる。⇒肥大に影響
- (3) 葉上げ（雨よけハウスで実施）
  - 葉摘みには限界があるので、輪ゴム・テープナー等で葉を束ねる
- (4) 反射マルチ
  - ・着色始め頃から設置する
  - ・高温対策として、白色マルチは「タイベック」「パールライトWS」等を使用する
  - ・着色を得られた部分は、マルチを早めに除去する

## ●その他

- ・雨よけハウスの被覆 ⇒ 5月20日～25日頃
- 高温による着色不良やウルミ果の発生を防ぐため、晴天時は天窓・サイドビニールを開ける

|                              |
|------------------------------|
| 次回特報発行予定：6/17<br>内容：7月散布について |
|------------------------------|