



ナシ特報 No.7

2021年7月16日
JA中野市営農センター
JA中野市ナシ部会

- ◆ 今回の特報は、和梨（有袋・無袋）と西洋梨（有袋・無袋）に分かれております。
- ◆ 結実不良園地では、和梨（有袋）の定期防除を実施して下さい。
- ◆ 今回の特報は、6/17発行の「ナシ特報 No6」の薬剤散布（和梨散布目安：有袋 7/10～15・無袋 7/20、西洋梨散布目安：有袋 7/10 前後・無袋 7/20 前後）が完了してから行う防除を記載しています。

【農薬散布時の注意事項】

- ①隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないよう十分注意する。
- ②散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬液が残らないよう注意する。

● 和梨（有袋）の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【有袋】7月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	7月25日～30日頃 ※左記は目安となります	◆ 散布日： 月 日
散布薬剤	水	◆ 散布量
	展着剤	リットル
	コロマイト乳剤	100ℓ
	ベルコートフロアブル	20ml
散布薬剤	コロマイト乳剤	100ml (前日、1回)
	ベルコートフロアブル	50ml (14日前、5回)
	劇イカズチWDG	66g (前日、3回)
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、カメムシ類、シンクイムシ類、ハダニ類	
散布量	10a 当り：450ℓ	
注意事項	① <u>早生種等、収穫前規制に注意する</u>	
	・ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。	
	② イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

● 和梨（無袋）の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【無袋】7月下旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	7月30日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日： 月 日
散布薬剤	水	◆ 散布量
	展着剤	リットル
	コロマイト乳剤	100ℓ
	ベルコートフロアブル	20ml
散布薬剤	コロマイト乳剤	100ml (前日、1回)
	ベルコートフロアブル	50ml (14日前、5回)
	劇イカズチWDG	66g (前日、3回)
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、カメムシ類、シンクイムシ類、ハダニ類	
散布量	10アール当り：450ℓ	
注意事項	① <u>早生種等、収穫前規制に注意する</u>	
	・ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。	
	② イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

西洋梨（有袋・無袋）の薬剤散布は裏面をご覧ください

● 西洋梨（有袋）の定期防除

【有袋】 7月下旬の薬剤散布（前回より20日後）

散布時期	7月30日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日： 月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ダニゲッターフロアブル 50ml (前日、1回) キノンドー顆粒水和剤 100g (3日前、9回) (劇)オリオン水和剤40 100g (3日前、2回)	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類	
散布量	10a 当り：600ℓ	
注意事項	① ダニゲッターフロアブルは開花期の水稲やシャインマスカットに飛散しないように注意する。 ② オリオン水和剤40は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

● 西洋梨（無袋）の定期防除

【無袋】 7月下旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	7月30日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日： 月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ダニゲッターフロアブル 50ml (前日、1回) キノンドー顆粒水和剤 100g (3日前、9回) (劇)オリオン水和剤40 100g (3日前、2回)	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ハダニ類	
散布量	10アール当り：600ℓ	
注意事項	① ダニゲッターフロアブルは開花期の水稲やシャインマスカットに飛散しないように注意する。 ② オリオン水和剤40は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

【7月中下旬の重点作業】

① 土壌水分管理（土壌水分の激変を緩和）

梅雨明け後の急激な土壌乾燥防止 ⇒ 樹冠下に敷きワラ等のマルチを早めに行ってください。

② 雑草管理：害虫の発生源となりますので、園内除草を徹底してください。

除草剤使用基準：①バスタ液剤（水100ℓ 当たり バスタ液剤500ml）収穫前日

②ザクサ液剤（水100ℓ 当たり ザクサ液剤500ml）収穫前日