

- 紅りょうぜんの出荷開始は7/11で、ほぼ昨年並の状況です。成熟状況をよく確認し、収穫遅れのないようご注意ください。
- スモモヒメシンクイ第1世代が増加傾向です。10日間隔以内の薬剤散布を徹底し、被害果実は園外で処分して下さい。

1. プラム（2回分の防除を掲載）

【第13回 定期防除】 対象病害虫：シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	●7月25日～8月3日（第12回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（まくぴか） 20mℓ ヨーバルフロアブル 20mℓ（前日、2回） 劇イカズチWDG 66g（前日、2回）	散布日 _____月____日 散布量 _____ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	【代替】ヨーバルフロアブルに代えて、フェニックスフロアブルの4000倍（前日、2回）でもよい。	

【第14回 定期防除】 対象病害虫：灰星病（すす点病）ハダニ類 シンクイムシ類（ケムシ類）

散布時期	●8月4日～13日（第13回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（まくぴか） 20mℓ パレード15フロアブル 50mℓ（前日、2回） アーデンドフロアブル 50mℓ（前日、3回）	散布日 _____8月____日 散布量 _____ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	【黒斑病（かいよう病）対策】 スターナ水和剤1000倍（7日前、3回）を加用する。	

劇・・・劇物をご購入の際は、印鑑をお持ちください

次ページもご覧ください

2. プルーン

【第9回 定期防除】 対象病害虫：灰星病(すす点病)、(シンクイムシ類) アブラムシ類

散布時期	・7月26日～8月2日 (第8回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り フリントフロアブル 25 50mℓ (前日、2回) 劇バリアード顆粒水和剤 50g (前日、2回)	散布日 _____月 _____日 散布量 _____ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	【ハダニ類 対策】 カネマイトフロアブルの1000倍(3日前、1回)を加用する	

【第10回 定期防除】 対象病害虫：灰星病 ハダニ類 シンクイムシ類

散布時期	・8月5日～13日 (第9回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り パレード15フロアブル 50mℓ (前日、2回) アーデントフロアブル 50mℓ (前日、3回)	散布日 _____8月 _____日 散布量 _____ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	【シンクイムシ類 対策】 ヨーバルフロアブルの5000倍(前日、2回)を加用する。	

●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査について (7/7時点) 調査：北信農業農村支援センター

2021年	一本木		草間		上今井		倭	
	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R3	R2
4月14日	設置		設置		設置		設置	
4月21日	1		0		0		0	
4月28日	2	設置	0	設置	2	設置	0	設置
5月5日	3	17	5	22	1	6	4	36
5月12日	9	9	10	17	1	7	24	15
5月19日	31	20	23	31	2	7	19	40
5月26日	17	36	10	10	1	0	20	86
6月2日	28	21	6	8	2	1	8	11
6月9日	9	4	5	5	0	20	4	39
6月16日	6	9	1	8	0	1	1	28
6月23日	15	17	18	2	0	1	5	6
6月30日	39	20	84	20	2	5	44	77
7月7日	25	16	146	32	13	15	37	114

*第1世代が増加傾向です。防除間隔10日以内での薬剤散布を徹底して下さい。

次回特報発行予定日：8月3日 問合せ先：園芸課・担当 金井(090-1867-2510)
横田(080-5147-8257)