



# ぶどう特報 No.9



2021年8月3日  
JA 中野市営農センター  
JA 中野市ぶどう部会

開花のバラツキ・園地環境・枝管理の程度・樹勢の強弱などにより水まわり時期にバラツキが生じています。  
水まわり確認後(8月上旬以降)から適宜、新梢管理・副梢整理を実施し、園地内に適度な明るさを確保してください。

2021年	満開 (平年比・前年比)	水まわり(ベレーゾン)目安 (満開 35~40 日頃)	収穫開始時期目安
巨峰 (長梢・自然系)	6/11 (+1・+2)	7/16~7/21 頃	9/1 頃(満開80~90日頃)
シャイン (短梢H型)	6/18 (+3・+5)	7/23~7/28 頃	9/17 頃(満開90~100日頃)

※水まわり(ベレーゾン)とは、果粒が軟化し弾力が出てくる時期をいう。黒系ぶどうでは着色し始める。

## 【第13回 定期散布】

散布時期	前回防除から10日後	散布日	月	日
散布薬剤	水 ICボルドー66D	100 L 2.5 kg ( - )		
散布量	400L / 10a			
対象病害虫	べと病、さび病、晩腐病			
注意事項	<p><b>【農薬飛散(ドリフト)注意】</b> 近隣園地の収穫物へのボルドー汚れ防止、モモ・プラム等への薬害防止のため、ボルドー剤を散布する際は、近隣園地に飛散しないように注意する。</p> <p>① ICボルドー66Dに代えてムッシュボルドーDF 500倍、コサイド3000 2,000倍でもよい。ムッシュまたはコサイドを使用する場合は、高温時での散布、降雨前や降雨直後の葉に水気がある状態で散布すると薬害が発生しやすくなるため、心配ならクレフノン100倍を加用する。</p>			

## 【特別散布】 収穫が遅れる園地 (10月以降の収穫園、冷蔵シャイン園など)

散布時期	9月上旬ころ	散布日	月	日
散布薬剤	水 展着剤(ハイテンパワー) ICボルドー66D	100 L 10 ml 2.5 kg ( - )		
散布量	400L / 10a			
対象病害虫	べと病、さび病、晩腐病			
注意事項	<p><b>【農薬飛散(ドリフト)注意】</b> 近隣園地の収穫物へのボルドー汚れ防止、モモ・プラム等への薬害防止のため、ボルドー剤を散布する際は、近隣園地に飛散しないように注意する。</p> <p>① ICボルドー66Dに代えてムッシュボルドーDF 500倍、コサイド3000 2,000倍でもよい。ムッシュまたはコサイドを使用する場合は、高温時での散布、降雨前や降雨直後の葉に水気がある状態で散布すると薬害が発生しやすくなるため、心配ならクレフノン100倍を加用する。</p> <p>② 収穫が遅れる場合は展着剤ハイテンパワーに代えてアビオン-E2,000倍を使用してもよい。</p>			

## ☆ 栽培日誌について

出荷をする場合は必ず栽培日誌を完全記入・提出しましょう。

紛失した場合や破損・汚損した場合には営農センター園芸課まで

本年の特報は今回で終了です。