

| 対象病害                    | 処理薬剤                   | 処理方法                       | 注意事項   |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 種子消毒<br>(いもち病、<br>ばか苗病) | テクリードCフロアブル<br>(100ml) | 200 倍に希釈した液に<br>24 時間浸漬する。 | 種モミ1kgに対して<br>希釈した薬液量 1.7ℓの<br>割合で処理する。<br>① 液温は 10℃以上 (15℃前後が理想)とする。<br>② 消毒後は水洗いせず、浸種する。浸種まで日にちが<br>空く場合、陰干して風乾させる。<br>③ 使用後の薬液は毒性が強いため河川に流したりせ<br>ず、適切な処理をする。 |
| 苗床<br>(苗立枯病)            | タチガレエース M 粉剤<br>(1 kg) | 育苗箱1箱(±5ℓ)<br>当り6~8g混和する。  | ① 薬量が多いと生育に害が出るので適正量で使用する。<br>② は種当日の混和を基本とする。事前使用では効果が落ちる場合ある。  |
| 苗箱施薬<br>(害虫、<br>いもち病)   | ブーンパディート箱粒剤<br>(1 kg)  | 育苗箱1箱当り 50g                | ① いもち病が心配ない圃場はパディート箱粒剤に代えて使用する。<br>② 紋枯病が昨年多発した圃場ではエバーゴルプラス箱粒剤を使用する。<br>③ 移植当日に使用する場合は、植付け直前に散布する。<br>散布後長く放置すると薬害が発生するため、早めに植えつける。                              |

| 月<br>日  | 散布時期                       | 散布薬剤(10a当り使用量)  | 代替農薬(10aあたり)                 | 注 意 事 項  |   |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--|---|
| 月<br>日  | 特別散布<br>代かき直後              | 農将軍フロアブル<br>(500ml)   | 500ml                        | ピラクロンフロアブル<br>(500ml)  | ① 田植えが代かきから7日以上後となる場合に限り<br>実施する。<br>② 実施した場合、散布後7日間は落水しない。<br>③ 代かき直後の水が濁っている時に散布する。   |
| 月<br>日  | 第1回<br>田植え<br>翌日           | アッパレZ1キロ粒剤<br>(1kg)   | 1kg                          | 【省力】<br>プライオリティジャンボ<br>(250g)<br>カウントダウンフロアブル<br>(500ml)<br>【省力】<br>アッパレZジャンボ<br>(400g)(田植え3日後~)                 | ① 除草剤散布後3日間は入水しない。<br>地面が露出してしまふ場合は、露出する前に入水する。<br>② 代かきから第1回の除草剤までの日数が空くほど、<br>雑草発生リスクはあがる。<br>③ 藻が全体の4割以上発生してしまった場合、モゲトン<br>粒剤(3 kg)を10a当たり2~3kg散布する。   |
| ガス湧き対策(田植え10日後):田に入った時泡が発生する場合は、田植え10日後から7日間程干してガス抜きをする。<br>ガス抜き後に入水したら、雑草の発生を確かめ第2回の防除を実施する。 |                            |   |                              |  |   |
| 月<br>日  | 第2回<br>田植え後<br>20日頃        | レプラス1キロ粒剤<br>(1kg)(田植え14日後~)  | 1 kg                         | 【省力】<br>レプラスジャンボ<br>(400g)(田植え14日後~)<br>【省力】<br>ツイゲキ豆つぶ 250<br>(250g)(田植え20日後~)<br>ツイゲキ1キロ粒剤<br>(1 kg)(田植え20日後~) | ① 雑草の発生に応じて実施する。<br>② 雑草の初期発生を見逃さないために、田んぼを覗き<br>込んで確認する。雑草が水面から出る前に早めに実<br>施する。<br>③ ツイゲキ豆つぶ 250 はジャンボ剤の一種です。<br>④ ツイゲキ豆つぶ 250 及びツイゲキ1キロ粒剤は、田植<br>え 20 日後以降の使用となります。散布時期に注意し<br>てください。                       |
| 月<br>日  | 特別散布<br>中干し期<br>(落水処理)     | 【粒タイプ】<br>バサグラン粒剤<br>(3 kg)(収穫60日前まで)<br>【散布タイプ】<br>クリンチャーバス ME 液剤<br>(500ml)(収穫50日前まで) | 3~4 kg<br>水 100ℓに<br>1,000ml | 【粒タイプ】<br>グラスジンMナトリウム粒剤<br>(3 kg)(収穫 60 日前まで)<br>【散布タイプ】<br>ロイヤント乳剤<br>(水 100ℓに 200ml)<br>(収穫 45 日前まで)           | ① バサグラン粒剤とグラスジンMナトリウム粒剤は<br>ヒエには効果がないため注意。<br>② ロイヤント乳剤はホタルイとクログワイに対して効果<br>が期待できないため注意。<br>③ 散布後4日間は水を入れない。<br>④ 散布後2日間に降雨があると効果が落ちるので、<br>天候に注意する。<br>⑤ 降雨が続く場合は晴れ間を見計らって「ロイヤント乳<br>剤」を散布する。(散布後2時間は降雨が無い時) |
| 月<br>日  | 特別散布<br>いもち病<br>出穂<br>20日前 | コラトップジャンボP<br>(500g(50g×10個))   | 小包装<br>10~13個<br>(500~650g)  | ブラシン粉剤 DL<br>(3 kg)  | ① いもち病の穂への感染を抑える目的で実施。<br>② 湛水状態で使用する。<br>③ 感染を予防するためなので、遅れると効果が薄い。   |
| 月<br>日  | 特別散布<br>出穂<br>7日後          | 【カメムシ対策】<br>スタークル豆つぶ<br>(250g)  | 250g                         | MR. ジョーカー粉剤DL<br>(3 kg)  | ① 湛水状態で散布する。<br>② 散布後3日間は、有効成分が薄まらないよう入水を<br>控える。   |

裏面の農薬使用基準もご確認ください。また、農薬を使用する際はラベルをよく読み正しく使いましょう。

## 種子消毒・苗床・苗箱施薬

|      | 農薬名          | 使用時期               | 使用量                           | 使用回数 | 対象病害虫  |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|--|
| 種子消毒 | テクリードCフロアブル  | 浸種前                | 200 倍に希釈した液に<br>24 時間浸漬する     | 1 回  | いもち病、ばか苗病、苗立枯細菌病<br>ごま葉枯病、もみ枯細菌病、褐条病   |
| 苗床   | タチガレエースM粉剤   | は種前                | 育苗箱 1 箱(土 5ℓ)当りに<br>6~8g 混和する | 1 回  | 苗立枯病(ピシウム菌、フザリウム菌)<br>ムレ苗防止  |
| 苗箱施薬 | ブーンパディート箱粒剤  | は種時(覆土前)<br>~ 移植当日 | 育苗箱 1 箱(土 5ℓ)当り 50g           | 1 回  | いもち病、ニカメイチュウ、イネツムシ、イネトヨイムシ、ヒメビウンカ<br>イネミスヅウムシ、ツマグロヨコバイ、フタバヒコヤカ、イネヒメモグリバエ     |
|      | パディート箱粒剤     | は種時(覆土前)<br>~ 移植当日 | 育苗箱 1 箱(土 5ℓ)当り 50g           | 1 回  | ニカメイチュウ、イネツムシ、イネヒメモグリバエ、イネトヨイムシ<br>イネミスヅウムシ、ツマグロヨコバイ、ヒメビウンカ、フタバヒコヤカ          |
|      | エバーゴルドプラス箱粒剤 | は種時(覆土前)<br>~ 移植当日 | 育苗箱 1 箱(土 5ℓ)当り 50g           | 1 回  | 紋枯病、いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病、ニカメイチュウ、ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ、イネミスヅウムシ、フタバヒコヤカ、イネトヨイムシ、イネツムシ |

## 除草剤

|     | 農薬名<br>(使用時期)   | 10a 当り使用量                  | 使用方法                            | 使用回数       | 適用雑草/病害虫  |
|-----|---|----------------------------|---------------------------------|------------|---|
| 初期  | <b>農将軍フロアブル</b><br>(植代後~移植 7 日前 又は移植直後~ルイ 1.5 葉期<br>ただし、移植後 30 日まで)   | 500 ml                     | 原液湛水散布                          | 1 回        | 水田一年生雑草、ホタルイ、ヘラオモダカ、<br>マツバイ、アオミドロ・藻類による表層はく離                                     |
|     | <b>ピラクロンフロアブル</b><br>(植代後~移植 7 日前 又は移植直後~ルイ 1.5 葉期<br>ただし、移植後 30 日まで) | 500 ml                     | 原液湛水散布                          | 1 回        | 水田一年生雑草、ホタルイ、オモダカ、ウリカワ<br>マツバイ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ<br>ヘラオモダカ                       |
| 初中期 | <b>アツパレZ1キログ粒剤</b><br>(移植直後~ルイ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで)                   | 1 kg                       | 湛水散布<br>(田植え同時散布機で<br>移植時に散布可能) | 1 回        | 一年生雑草、ホタルイ、オモダカ、ミスガヤツリ<br>マツバイ、クログワイ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、ウリカワ<br>アオミドロ・藻類による表層はく離、シズイ、セリ |
|     | <b>プライオリティジャンボ</b><br>(移植直後~ルイ 3.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで)                 | 小包装(パック)<br>10 個<br>(250g) | 湛水水田へ<br>小包装(パック)のまま<br>投げ込む    | 1 回        | 一年生雑草及び多年生雑草  |
|     | <b>カウントダウンフロアブル</b><br>(移植直後~ルイ 3.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで)                | 500 ml                     | 原液湛水散布                          | 1 回        | 一年生雑草及び多年生雑草  |
|     | <b>アツパレZジャンボ</b><br>(移植 3 日後~ルイ 3 葉 ただし、移植後 30 日まで)                   | 小包装(パック)<br>10 個<br>(400g) | 湛水水田へ<br>小包装(パック)のまま<br>投げ込む    | 1 回        | 水田一年生雑草、ホタルイ、マツバイ、オモダカ、<br>シズイ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、ウリカワ、<br>ヘラオモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ       |
| 中後期 | <b>ツイゲキ1キログ粒剤</b><br>(移植後 20 日(ルイ 5 葉期以降)~ルイ 4.0 葉期<br>ただし収穫 60 日前まで) | 1 kg                       | 湛水散布                            | 1 回        | 一年生雑草及び多年生広葉雑草<br>アオミドロ・藻類による表層はく離  |
|     | <b>レブラス1キログ粒剤</b><br>(移植後 14 日~ルイ 4 葉期ただし収穫 60 日前まで)                  | 1 kg                       | 湛水散布                            | 1 回        | 水田一年生雑草、ホタルイ、オモダカ、マツバイ<br>クログワイ、シズイ、ミスガヤツリ、コウキヤガラ、セリ<br>ウリカワ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ         |
|     | <b>レブラスジャンボ</b><br>(移植後 14 日~ルイ 4 葉期ただし収穫 60 日前まで)                    | 小包装(パック)<br>10 個<br>(400g) | 湛水水田へ<br>小包装(パック)のまま<br>投げ込む    | 1 回        | 水田一年生雑草、多年生広葉雑草   |
|     | <b>ツイゲキ豆つぶ 250</b><br>(移植後 20 日(ルイ 5 葉期以降)~ルイ 4 葉期<br>ただし収穫 75 日前まで)  | 250g                       | 湛水散布                            | 1 回        | 一年生雑草、ホタルイ、オモダカ、マツバイ、セリ<br>クログワイ、ミスガヤツリ、コウキヤガラ、ヒルムシロ<br>ウリカワ、アオミドロ・藻類による表層はく離     |
| 後期  | <b>バサグラン粒剤</b><br>(移植後 15~55 日 ただし収穫 60 日前まで)                         | 3~4 kg                     | 落水散布又は、<br>ごく浅く湛水して散布           | 1 回        | 水田一年生雑草(イネ科を除く)<br>ホタルイ、オモダカ、クログワイ、ミスガヤツリ、シズイ<br>ヘラオモダカ、ウリカワ、マツバイ、エゾノサヤカグサ        |
|     | <b>グラスジンMナトリウム粒剤</b><br>(有効分けつ終止期~幼穂形成期 ただし、収穫 60 日前まで)               | 3~4 kg                     | 落水散布                            | 1 回        | 水田一年生雑草(イネ科を除く)<br>ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、マツバイ、   |
|     | <b>クリンチャーバスME液剤</b><br>(移植後 15 日~ルイ 5 葉期まで ただし、収穫 50 日前まで)            | 水 100ℓに 1,000 ml           | 落水散布又は、<br>ごく浅く湛水して散布           | 2 回<br>以内  | 一年生雑草、ホタルイ、オモダカ、シズイ、セリ<br>クログワイ、ヘラオモダカ、コウキヤガラ、ウリカワ<br>キシウスズメヒエ                    |
|     | <b>ロイヤント乳剤</b><br>(移植後 20 日~ルイ 5 葉期まで<br>ただし、収穫 45 日前まで)              | 水 100ℓに 200 ml             | 落水散布又は、<br>ごく浅く湛水して散布           | 2 回<br>以内  | 一年生広葉雑草、ルイ、マツバイ、オモダカ<br>アゼガヤ、マツバイ、ウリカワ、セリ   |
| 藻類  | <b>モゲトン粒剤</b><br>(ウキクサ類、藻類の発生始~発生盛期 ただし、収穫 45 日前まで)                   | 2~3 kg                     | 湛水散布                            | 2 剤合<br>せて | 藻類による表層はく離、ウキクサ類、ウリカワ<br>藻類(アオミドロ、アミドロ)、ヒルムシロ                                     |
|     | <b>モゲトンジャンボ</b><br>(ウキクサ類、アオミドロ・藻類による表層剥離発生時<br>ただし、収穫 45 日前まで)       | 20 個(1 kg)                 | 湛水状態で<br>投げ入れる                  | 3 回<br>以内  | アオミドロ・藻類による表層はく離、ウキクサ類、   |

## 殺虫・殺菌剤

| 農薬名                  | 10a 当り使用量                     | 使用時期                     | 使用回数  | 対象病害虫   |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------|---|
| <b>コラトップジャンボP</b>    | 小包装(パック)<br>10~13 個(500~650g) | 穂いもちに対して<br>出穂 30~5 日前まで | 2 回以内 | いもち病  |
| <b>ブラシン粉剤DL</b>      | 3 kg                          | 収穫 7 日前まで                | 2 回以内 | いもち病、変色米(カーブリア菌、エビコッカム菌)<br>穂枯れ(ごま葉枯病、すじ葉枯病)                  |
| <b>スタークル豆つぶ</b>      | 250g                          | 収穫 7 日前まで                | 3 回以内 | カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ   |
| <b>MR. ジョーカー粉剤DL</b> | 3 kg                          | 収穫 7 日前まで                | 2 回以内 | カメムシ類、ウンカ類、イナゴ類、コブノメイガ、フタバヒコヤカ<br>イネトヨイムシ、ツマグロヨコバイ、イネミスヅウムシ成虫 |

農薬を使用する際はラベルをよく読んでから使いましょう。また、裏面の農薬使用基準もご確認ください