



果樹特報 No.4

令和4年 4/28号

J A中野市営農センター
J A中野市りんご・もも部会

今回の内容：ふじ落花 10 日後 黒星病要注意

2022 生育 発芽：4/5 展葉 4/10 開花 4/25 満開 4/28 頃 落花 5/4 頃 * 平年比 - 2 日

りんごの生育は平年比 2 日程度早く進んでいます。現在、黒星病の重点防除期間中です。4 月中旬からの降雨で黒星病感染拡大が心配されます。散布間隔を概ね 10 日程度とし、防除を徹底してください。

*落花後の薬剤散布内容は特報 No3 (4/15 配布) を参照ください。

【重要】 展着剤ササラを第 2 回～第 6 回目まで使用します。薬液が葉裏によく広がり、散布後の乾きも早くなる効果があります。

5 月中旬 (定期) *ふじ落花 10 日後 (前回から 10 日後)

散布時期：5/16～21 頃 *現時点での目安です。生育により前後します。

散布薬剤：水	1 0 0 リットル
展着剤 (ササラ)	5 0 ml
トランスフォームフロアブル	5 0 ml (前日、3 回)
ジマンダイセン水和剤	2 0 0 g (30 日前、3 回)

【5 月中旬の定期散布】

散布日：5 月	日
散布量：	リットル

対象病害虫：黒星病・黒点病・褐斑病・アブラムシ類・カイガラムシ類・コアオカスミカメ・リンゴワタムシ

10a 当り散布量：500 リットル

【5 月中旬】

【注意事項】

- ① 枝腐らん病対策：トップジン M 水和剤 1,000 倍 (前日、6 回) を加用する。
- ② 幼果カルシウム補給：カルタス 1,000 倍を加用する。 目安：第 5 回～第 7 回までの連続散布

5 月下旬の【黒星病】特別散布 *前回から概ね 7 日後

散布時期：5/23～28 頃 *散布日は現時点の予想です。生育状況により前後します。

散布薬剤：水	1 0 0 リットル
展着剤 (ササラ)	5 0 ml
ジマンダイセン水和剤	2 0 0 g

*【代替】ハイテンパワー10,000 倍 (30 日前・3 回)

【5 月下旬の特別散布】

散布日：5 月	日
散布量：	リットル

対象病害虫：黒星病・黒点病・褐斑病

10a 当り散布量：500 リットル

【5 月下旬 特別散布】

果樹特報 No1～4 は JA 中野市ホームページに公開中です。パソコン・スマートフォンからもアクセスできます。
次回特報発行予定：5/17 問合せ先：園芸課 (23-3933)

