

この特報は、4/28 発行の「もも・ネクタリン特報No.④」の薬剤散布（散布目安は、5/20～25 頃）が終わってから行なう防除を掲載しています。特報No.④の内容を再度、ご確認ください。

「せん孔細菌病」春型枝病斑の発生が始まっています。園地内の状況をよく確認し、見つけ次第切除の徹底をお願いします。

ネクタリンの定期散布については、次面をご覧ください。

もも

第6回 定期散布

散布時期 5月末～6月初旬（第5回 定期散布から10日後）

・散布日の目安：5月30日～6月5日頃

散布日 5・6月 日

散布量 リットル

散布薬剤 水 100リットル当り

アビオンE（展着剤） 100ml

アルバリン顆粒水溶剤 50g（収穫前日まで、3回以内）

トレノックスフロアブル 200ml（収穫7日前まで、5回以内）

マイコシールド 66g（収穫21日前まで、5回以内）

散布量 10アール当り 500リットル

対象病害虫 せん孔細菌病、黒星病、灰星病、モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類

もも特別散布

散布時期 6月上旬（第6回 定期散布から7～10日後）

・散布日の目安：6月7日～15日頃

散布日 6月 日

散布量 リットル

散布薬剤 水 100リットル当り

アビオンE（展着剤） 100ml

マイコシールド 66g（収穫21日前まで、5回以内）

散布量 10アール当り 500リットル

対象病害虫 せん孔細菌病

第7回 定期散布

散布時期 6月中旬（第6回 定期散布から14日後）

・散布日の目安：6月13日～6月20日頃

散布日 6月 日

散布量 リットル

散布薬剤 水 100リットル当り

アビオンE（展着剤） 100ml

デランフロアブル 166ml（収穫7日前まで、4回以内）

劇剤 ダーズバンDF 33g（収穫14日前まで、5回以内）

マイコシールド 66g（収穫21日前まで、5回以内）

散布量 10アール当り 500リットル

対象病害虫 せん孔細菌病、黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ウメシロカイガラムシ

注意事項 ①カメムシ類対策：スミチオン水和剤40の1,000倍（3日前、6回）を加用する。

ネクタリン

第6回 定期散布

散布時期	5月末～6月初旬（第5回 定期散布から10日後） ・散布日の目安：5月30日～6月5日頃	散布日 5・6月 日 散布量 リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り アビオンE（展着剤） 100ml アルバリン顆粒水溶剤 50g（収穫前日まで、3回以内） トレノックスフロアブル 200ml（収穫30日前まで、5回以内） マイコシールド 66g（収穫28日前まで、5回以内）	
散布量	10アール当り 500ℓ	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、シンクイムシ類、モモハモグリガ、アブラムシ類、カメムシ類	

第7回 定期散布

散布時期	6月中旬（第6回 定期散布から14日後） ・散布日の目安：6月13日～6月20日	散布日 6月 日 散布量 リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り アビオンE（展着剤） 100ml デランフロアブル 166ml（収穫14日前まで、2回以内） 劇 ダーズバンDF 33g（収穫14日前まで、2回以内） スターナ水和剤 100g（収穫7日前まで、3回以内）	
散布量	10アール当り 500ℓ	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、ハマキムシ類	
注意事項	せん孔細菌病対策：スターナ水和剤に代えてマイコシールドの1,500倍（28日前、5回）を使用する。 ※早生種は収穫前規制に注意する。	

「せん孔細菌病」春型枝病斑除去 撲滅週間

期間：5月17日（火） ～ 5月27日（金）

「せん孔細菌病」春型枝病斑の発生が始まっています。そのため、昨年
に引き続き枝病斑切除の強化週間を設定いたしました。

もも・ネクタリン栽培者の方におかれましては、作業のお忙しい中ですが
枝病斑切除の徹底をお願いします。

切除方法

- ① 結果枝の先端部・中間部を点検する。
- ② 枝病斑よりも基部の健全な芽を3～4芽含んで切除する。

