



ナシ特報・西洋梨 No.5

2022年6月2日
J A 中野市営農センター
J A 中野市ナシ部会

- ◆ 今回の特報は、西洋梨のみ（有袋・無袋）を記載しております。
- ◆ 毎日のお仕事お疲れ様です。西洋梨は全域で結実・肥大共に良好に進んでいます。6月下旬の散布が終わり次第、早めに袋掛けを行って下さい。
- ◆ 6/10（金）に南水の講習会を開催致します。本年の南水結実状況は、中野市全体でやや不足しています。講習会では仕上げ摘果を含め新梢管理中心に行います。
※詳細は、6/2 同時配布の講習会開催通知・ナシ部会特報 No2 をご覧下さい。

● 西洋梨（有袋）の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意して下さい。）

【有袋】6月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	6月20日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml シトラノフロアブル 100ml (30日前、3回) 劇ダイアジノン水和剤 34 100g (14日前、6回)	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、コナカイガラムシ	
散布量	10a 当り：600ℓ	
注意事項	① 輪紋病対策：輪紋病感染防止のため、散布後3日以内に袋を掛ける。 ② ハダニ類対策：カネマイトフロアブル1,000倍（前日、1回）を加用する。 ③ ダイアジノン水和剤 34 は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参して下さい。 ④ 在庫整理：ダイアジノン水和剤 34 に代えてスプラサイド水和剤（1,500倍、7日前、3回）を使用しても良い。	

● 西洋梨（無袋）の定期防除 ※輪紋病の最重要防除期間

【無袋】6月中旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	6月10日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水 100ℓ IC ボルドー412 3.3kg	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病	
散布量	10アール当り：600ℓ	
注意事項	① IC ボルドー412 に代えてオキシラン水和剤の500倍（3日前、9回）でも良い。 ② 葉やけ防止のため涼しい時間帯に散布する。	

【無袋】6月下旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	6月20日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水 100ℓ IC ボルドー412 3.3kg 劇ダイアジノン水和剤 34 100g (14日前、6回)	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、アブラムシ類、カイガラムシ類	
散布量	10アール当り：600ℓ	
注意事項	① IC ボルドーに代えて、オキシラン水和剤の500倍（3日前、9回）でも良い。 ② 葉やけ防止のため涼しい時間帯に散布する。 ③ ダイアジノン水和剤 34 は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参して下さい。 ④ 在庫整理：ダイアジノン水和剤 34 に代えてスプラサイド水和剤（1,500倍、21日前、2回）を使用しても良い。	