



- ◆ 今回の特報は、和梨（有袋・無袋）と西洋梨（有袋・無袋）に分かれております。
- ◆ 裏面には西洋梨の定期防除について記載しています。

● 和梨（有袋）の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意して下さい。）

**【有袋】7月上旬の薬剤散布（前回より15日後）**

散布時期	7月5日～10日頃 ※左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml アーデントフロアブル 50ml（前日、3回） ロブドー水和剤 125g（14日前、5回）	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	黒斑病、黒星病、シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類、アブラムシ類	
散布量	10a 当り：450ℓ以上	
注意事項	① <u>袋掛け後の防除とする。</u> ② 【代替】ロブドー水和剤に代えて、キノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）でも良い。 ③ 【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアビオンEの1,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。	

● 和梨（無袋）の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意して下さい。）

**【無袋】6月下旬の薬剤散布（前回より10日後）**

散布時期	6月25日～30日頃 ※左記は目安となります	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml アーデントフロアブル 50ml（前日、3回） ロブドー水和剤 125g（14日前、5回）	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	黒斑病、黒星病、シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類、アブラムシ類	
散布量	10アール当り：450ℓ	
注意事項	① 【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアビオンEの1,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。	

**【無袋】7月上旬の薬剤散布（前回より10日後）**

散布時期	7月5～10日頃 ※左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ベルクートフロアブル 50ml（14日前、5回）	◆ 散布量 ℓ
対象病害虫	黒斑病、黒星病、輪紋病	
散布量	10アール当り：450ℓ	
注意事項	① 【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアビオンEの1,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。	

## 西洋梨（有袋）の定期防除

### 【有袋】7月初旬の薬剤散布 特別散布

散布時期	7月1日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日： 月 日
散布薬剤	水 100㍓ 展着剤 10ml オキシラン水和剤 200g (3日前、9回)	◆ 散布量 <span style="float: right;">㍓</span>
対象病害虫	輪紋病	
散布量	10a当り：600㍓	
注意事項	① <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">輪紋病対策</span> ：袋掛けが遅れている場合は、今回の特別散布を実施する。 散布時期は前回より10日後を目安とする。	

### 【有袋】7月上旬の薬剤散布（前回より20日後）

散布時期	7月10日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100㍓ 展着剤 10ml 劇バイスロイドEW 50ml (7日前、2回) ナリアWDG 50g (前日、3回)	◆ 散布量 <span style="float: right;">㍓</span>
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、アブラムシ類	
散布量	10a当り：600㍓	
注意事項	① ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないように注意する。 ② バイスロイドEWは劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参して下さい。	

## 西洋梨（無袋）の定期防除

### 【無袋】6月末の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	6月30日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日： 月 日
散布薬剤	水 100㍓ 展着剤 10ml 劇バイスロイドEW 50ml (7日前、2回) ナリアWDG 50g (前日、3回)	◆ 散布量 <span style="float: right;">㍓</span>
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、アブラムシ類	
散布量	10アール当り：600㍓	
注意事項	① ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないように注意する。 ② ハダニ類対策：カネマイトフロアブル1,000倍（前日、1回）を加用する。 ③ バイスロイドEWは劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参して下さい。	

### 【無袋】7月上旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	7月10日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100㍓ 展着剤 10ml ベルクートフロアブル 50ml (14日前、5回)	◆ 散布量 <span style="float: right;">㍓</span>
対象病害虫	輪紋病	
散布量	10アール当り：600㍓	
注意事項	① ベルクートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるため使用しない。	