



柿 特報 No.4

定期散布を徹底し、高品質な柿を生産しましょう！

R4年度 開花日:5/29頃 満開日:6/1 (平岡)

花のついていない枝(カラ枝)や着果にバラつきがある枝がありますので、樹の様子を見ながら摘果(着果量の調整)を行って下さい。

病害虫の防除は予防を意識し、早めの散布を実施しましょう。

病害虫防除

隣接園(特に収穫期の作物)に飛散しないように注意して下さい

●7月上中旬の散布

散布薬剤	水	100ℓ	散布日 7月 日
	展着剤	10ml	
	キノド一颗粒水和剤	100g (14日前、5回)	
対象病害虫	落葉病、炭疽病、うどんこ病		
散布量	10a当り 500ℓ *若木の場合、樹体に十分かかる量を散布する		
注意事項	① カイガラムシ類の発生が多い場合は、コルト颗粒水和剤の2,000倍(前日、3回)を加用する。 ② すず点病が発生する園地は、キノド一颗粒水和剤に代えて、ベルコート水和剤1,500倍(14日前、3回)を使用する。 ③ 昨年、カキノヘタムシガが発生した園地(収穫前落果の発生園)では、スミチオン水和剤40(30日前、3回)の800倍を加用する。		

◆ 柿 栽培管理講習会の開催について

期 日 : 6月21日(火) 午前10時 高社共選所 集合
内 容 : 仕上げ摘果、新梢管理、防除等

防除の際は必ず栽培日誌に記帳しましょう