



ぶどう特報 #8



2022年7月15日
JA 中野市園芸課
JA 中野市ぶどう部会

- ◆ 水まわり期（ベレーゾン）：果粒が軟化し弾力が出てくる時期を指す。黒系品種では着色始期。
満開 35～45 日頃 ⇒ 巨峰系：7/20～31 頃 シャインマスカット：7/25～8/5 頃
- ◆ ベレーゾン直前の枝管理注意点：シャインマスカット等の縮果症防止のため、過度な枝管理（強摘芯等）は控えてください。
- ◆ 露地収穫解禁予定：ナガノパープル 8/28、巨峰 8/28、種なし巨峰 9/4、シャインマスカット 9/20、クイーンルージュ®9/25 *概ねの解禁予定です。気象条件等で前後する場合があります。

【7月下旬の定期散布 *共通】

散布時期	袋掛け直後	散布日：7月 日
散布薬剤	水	100ℓ
	アビオン E（展着剤）	50 ml
	ムッシュボルドーDF	200g（－・－）
	アルバリン顆粒水溶剤	50g（前日・3回）
散布量	400ℓ/10a	散布量： ℓ
適用病害虫	べと病、さび病、ブドウトラカミキリ、カメムシ類、クビアカスカシバ、チャノキイロアザミウマ、コナカイガラムシ類 他	
注意事項	① 【ハダニ類対策】コロマイト水和剤 2,000 倍（7 日前、・2 回）を加用する。 ② 【クビアカスカシバ対策】パダン SG1,500 倍（21 日前、5 回）を加用する。 ③ 【代替】アビオン E に代えて、K・K ステッカー 3,000 倍でもよい。尚、K・K ステッカーを使用する場合、調合は最後とする。	

【8月上旬の定期散布 *共通】

散布時期	前回から 10 日後	散布日：8月 日
散布薬剤	水	100 ℓ
	I C ボルドー66D	2.5 kg（－・－）
	テルスター水和剤	100g（14 日前・1 回）
散布量	400ℓ/10a	散布量： ℓ
適用病害虫	晩腐病、さび病、べと病、チャノキイロアザミウマ	
注意事項	① 【コガネムシ類対策】テルスター水和剤に代えて、イカズチ WDG1,500 倍（21 日前・5 回）を使用する。ただし、早生種（ナガノパープル等）は収穫前規制に注意する。 ② 【展着剤】アビオン E 2,000 倍又は K・K ステッカー 3,000 倍でもよい。尚、K・K ステッカーを使用する場合、調合は最後とする。 ③ 【ボルドー液代替】IC ボルドー66D に代えて、ムッシュボルドーDF500 倍、コサイド 3000 の 2,000 倍、4-4 式ボルドーのいずれかを使用してもよい。ただし、ムッシュボルドーやコサイド 3000 を使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。	

特報 #9 8/1 付け発行予定。8月中旬・下旬定期散布記載予定。