

# もも・ネクタリン特報 No. ⑧

2022. 7. 14

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

※この特報⑧は、6/30 発行の「もも・ネクタリン特報No.⑦」の薬剤散布（散布目安は、7/11～21 頃）が終わってから行なう防除を掲載しています。特報No.⑦の内容を再度、ご確認ください。

※今年の生育は、空梅雨で経過し連続した高温の影響により、中野市全域で果実肥大がやや悪い状況です。そのため今後の気象に十分注意し、高温が続く場合には定期的なかん水を行って下さい。

※新梢が繁茂している場合は、徒長枝の整理を行い樹冠内の日当たりを改善して下さい。

※裏面には、もも早生種「白鳳・あかつき」目揃会について記載しています。ご確認ください。

もも

## 第10回 定期散布

散布時期 7月下旬～8月初旬（第9回目の定期散布から14日後）

・散布日の目安：7月25日～8月5日

散布日 月 日

散布量 リットル

散布薬剤 水 100ℓ当り

展着剤（ハイテンパワー） 10ml

ベルコートフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内）

アーデントフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内）

散布量 10アール当り 500ℓ

混用順 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートフロアブル ⇒ アーデントフロアブル

対象病害虫 灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類

注意事項 ①有袋品種は除袋後に散布する。  
②カイガラムシ類対策：コルト顆粒水和剤の2,000倍（前日、3回）を加用する。  
③せん孔病発生園（晩生種）で袋掛けが終了していない場合は、スターナ水和剤1,000倍（収穫7日前、3回）を加用する。収穫前規制に注意する。

ネクタリン

## 第10回 定期散布

散布時期 7月下旬～8月初旬（第9回目の定期散布から14日後）

・散布日の目安：7月25日～8月5日

散布日 月 日

散布量 リットル

散布薬剤 水 100ℓ当り

展着剤（ハイテンパワー） 10ml

ベルコートフロアブル 50ml（収穫前日まで、2回以内）

アーデントフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内）

散布量 10アール当り 500ℓ

混用順 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートフロアブル ⇒ アーデントフロアブル

対象病害虫 黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類

注意事項 ①せん孔病発生園（晩生種）で袋掛けが終了していない場合は、スターナ水和剤1,000倍（収穫7日前、3回）を加用する。収穫前規制に注意する。