

日

JA中野市営農センター
JA中野市プラム部会

●紅りょうぜんの出荷開始予想は、7/15で、昨年より3日程遅れています。園地の成熟状況を良く確認し、収穫遅れのないようにご注意ください。

●スモモヒメシンクイ第1世代が増加傾向です。10日間隔以内の薬剤散布を徹底し、被害果実は園外で処分して下さい。

1. プラム（2回分の防除を掲載）

【第12回 定期防除】 対象病害虫：灰星病(すす点病)、アブラムシ類（シンクイムシ類）

散布時期	● 7月21日～7月30日 （第11回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（まくぴか） 20mℓ フリントフロアブル 25 50mℓ （前日、2回） 劇バリアード顆粒水和剤 50g （前日、2回）	散布日 _____ 7月 _____ 日 散布量 _____ ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	黒斑病（かいよう病）対策。発生地は、バリダシン液剤5の500倍（3日前、4回）を加用する	

【第13回 定期防除】 対象病害虫：シンクイムシ類

散布時期	● 7月31日～8月9日 （第12回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（まくぴか） 20mℓ 劇イカズチWDG 66g （前日、2回）	散布日 _____ 8月 _____ 日 散布量 _____ ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	

劇・・・劇物をご購入の際は、印鑑をお持ちください

裏面もご覧ください

2. プルーン

【第8回 定期防除】 対象病害虫：灰星病 シンクイムシ類 (ケムシ類)

散布時期	・7月19日～7月28日 (第7回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り オンリーワンフロアブル 50mℓ (前日、3回) 劇イカズチWDG 66g (前日、2回)	散布日 7月 日 散布量 ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	今回以降、果粉(ブルーム)溶脱防止及び果実汚染防止のため展着剤は使用しない。	

【第9回 定期防除】 対象病害虫：灰星病 (すす点病) (シンクイムシ類) アブラムシ類

散布時期	・7月29日～8月7日 (第9回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り フリントフロアブル25 50mℓ (前日、2回) 劇バリアード顆粒水和剤 50g (前日、2回)	散布日 月 日 散布量 ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	【ハダニ類対策】 カネマイトフロアブルの1000倍(3日前、1回)を加用する。	

●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査について(7/6時点) 調査：北信農業農村支援センター

調査日	一本木	草間	上今井	倭
4月20日	設置	設置	設置	設置
4月27日	4	2	1	0
5月4日	4	14	0	10
5月11日	12	27	3	18
5月18日	7	19	6	22
5月25日	22	11	3	87
6月1日	14	16	3	21
6月8日	11	6	7	0
6月15日	3	0	1	1
6月22日	13	5	2	3
6月29日	50	49	6	36
7月6日	35	22	8	80

*第1世代が増加傾向です。防除間隔10日以内での薬剤散布を徹底して下さい。

次回特報発行予定日：8月1日 問合せ：園芸課・担当 横田(080-5147-8257)
金井(090-1867-2510)