

●本年は収穫開始から果肉軟化が早い傾向です。
収穫期を迎えた品種は、収穫遅れのないように日々園地確認お願い致します。

●スモヒメシンクイの発生が散見されます。第2世代が8月上旬頃に発生のピークを迎えると予想されます。
引き続き、10日間隔以内の薬剤散布を徹底し、被害果実は園外で処分して下さい。

1. プラム（2回分の防除を掲載）

【第14回 定期防除】 対象病害虫：灰星病（すす点病）ハダニ類 シンクイムシ類（ケムシ類）

散布時期	・8月10日～8月19日（第13回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（まくぴか） 20mℓ パレード15フロアブル 50mℓ（前日、2回） アーデントフロアブル 50mℓ（前日、3回）	散布日 8月 日 散布量 ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	

【第15回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・8月20日～8月29日（第14回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（まくぴか） 20mℓ オンリーワンフロアブル 50mℓ（前日、3回） エクシレルSE 40mℓ（前日、3回）	散布日 8月 日 散布量 ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	【シンクイムシ類対策】 劇モスピラン顆粒水溶剤の2,000倍（前日、3回）を加用する。	

劇・・・劇物。ご購入の際は、印鑑をご持参ください。

次ページに、プルーン防除等を掲載しております

2. プルーン（2回分の防除を掲載）

【第10回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ハダニ類

散布時期	・ 8月8日～8月17日 （第9回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水 100ℓ当り		散布日 8月 日
	パレード15フロアブル 50mℓ （前日、2回）		散布量 ℓ
	アーデントフロアブル 50mℓ （前日、3回）		
散布量	10aあたり 500ℓ		

【第11回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・ 8月18日～8月27日 （第10回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水 100ℓ当り		散布日 8月 日
	オンリーワンフロアブル 50mℓ （前日、3回）		散布量 ℓ
	エクシレルSE 40mℓ （前日、3回）		
散布量	10aあたり 500ℓ		
注意事項	【晩生種 灰星病・シンクイムシ類対策】 9月上旬に、オーシャインフロアブル3,000倍（前日、3回）と、  モスピラン顆粒水溶剤の2,000倍（前日、3回）を特別散布する。		

● スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査について（7/28時点） 調査：北信農業農村支援センター

調査日	JA 中野市プラム部会		日本スモモ(調査:毎週水曜日)	
	一本木	草間	上今井	倭
6月22日	13	5	2	3
6月29日	50	49	6	36
7月6日	35	22	8	80
7月13日	29	28	9	66
7月20日	18	3	6	47
7月28日	8	19	5	20

*第2世代の発生ピークは8月上旬頃と予想されます。

*防除間隔10日以内での薬剤散布を徹底して下さい。

【重要】

- ・隣接園（特に、今後収穫期を迎える作物）に飛散しないよう十分注意する。
- ・散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行ない、薬液が残らないようにする。