

もも・ネクタリン特報 No. ⑩

2022. 8. 17

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

※ この特報⑩は、8/1 発行の「もも・ネクタリン特報No.⑨」の薬剤散布（散布目安は、8/8～18 頃）が終わってから行なう防除を掲載しています。特報No.⑨の内容を再度、ご確認ください。

※ 【収穫について】あかつきの経過を見ると、8月上旬の降雨の影響もあり、果肉軟化（過熟果）・核割れ果実が散見。また、早取りの果実もやや多く選果では、糖度不足が発生。収穫前に必ず食味チェックをし、収穫を進めてくださいますようお願いいたします。

※農薬散布時の注意事項

- ①隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないよう十分注意する。
- ②散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬液が残らないよう注意する。

も も

第12回 定期散布

*有袋栽培で除袋が間近な場合は、除袋後に散布する

散布時期	8月下旬（第11回目の定期散布から14日後） ・散布日の目安：8月22日～31日	散布日	8月	日
		散布量		リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルコートフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内） アーデントフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内）			
散布量	10アール当り 500ℓ			
混用順	水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートフロアブル ⇒ アーデントフロアブル			
対象病害虫	灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類			

ネクタリン

第12回 定期散布

散布時期	8月下旬（第11回目の定期散布から14日後） ・散布日の目安：8月22日～31日	散布日	8月	日
		散布量		リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルコートフロアブル 50ml（収穫前日まで、2回以内）			
散布量	10アール当り 500ℓ			
混用順	水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートフロアブル			
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病			
注意事項	①もも混植園 シンクイムシ類対策：アーデントフロアブル2,000倍（前日、3回）を加用する。			