

●本年は収穫開始から果肉軟化が早い傾向です。
収穫期を迎えた品種は、収穫遅れのないように日々園地確認お願い致します。

●シンクイムシ類の発生が急増する時期です。スモモヒメシンクイだけでなく、モモシンクイガの被害も散見されます。薬剤散布間隔は 10日以内を厳守して下さい。また、被害果実は園外で処分して下さい。

1. プラム

【 特別散布 】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・ 8月30日～9月8日 (第15回定期散布から10日後)		
散布薬剤	水	100ℓ当り	散布日 ____月____日
	展着剤 (まくぴか)	20mℓ	
	パレード15フロアブル	50mℓ (前日、2回)	散布量 _____ℓ
	アーデントフロアブル	50mℓ (前日、3回)	
散布量	10aあたり 500ℓ		

2. プルーン

【 特別散布 】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、アブラムシ類、カイガラムシ類

散布時期	・ 8月28日～9月6日 (第11回定期散布から10日後)		
散布薬剤	水	100ℓ当り	散布日 ____月____日
	オーシャインフロアブル	33mℓ (前日、3回)	
	劇 モスピラン顆粒水溶剤	50g (前日、3回)	散布量 _____ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ		
注意事項	【代替】モスピラン顆粒水溶剤に代えて、アーデントフロアブルの2000倍(前日、3回)を使用してもよい。		

2022	一本木	草間	上今井	倭
6月29日	50	49	6	36
7月6日	35	22	8	80
7月13日	29	28	9	66
7月20日	18	3	6	47
7月27日	8	19	5	20
8月3日	53	121	21	104

＊第2世代の発生ピークは8月上旬頃と予想されます。

＊防除間隔10日以内での薬剤散布を徹底して下さい。

【重要】

- ・隣接園（特に、今後収穫期を迎える作物）に飛散しないよう十分注意する。
- ・散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行ない、薬液が残らないようにする。

次回特報発行予定日：9月1日 問合先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）
金井（090-1867-2510）