



# ナシ特報 No.10

令和4年8月17日  
JA中野市営農センター  
JA中野市ナシ部会

- ◆ 今回の特報は、8/1 発行の「ナシ特報 No9」の薬剤散布（散布目安：和梨散布目安：有袋 8/20～8/25・無袋 8/15～20 頃、西洋梨散布目安：有袋 8/20 前後・無袋 8/20 前後）が完了してから行う防除を記載しています。
- ◆ 今回の特報では【和梨・西洋梨】の最終防除を記載しております。
- ◆ 西洋梨の薬剤散布は裏面をご覧ください。
- ◆ **【農薬散布時の注意事項】**
  - ① 隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないよう十分注意する。
  - ② 散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬液が残らないよう注意する。

**和梨**の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意して下さい。）

## 【有袋】8月下旬～9月初旬の薬剤散布（前回より10日後）

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 散布時期  | 8月30日～9月5日頃 *左記は目安となります   | ◆ 散布日： 月 日  |
| 散布薬剤  | 水   | 100ℓ        |
|       | 展着剤   | 10ml        |
|       | ダントツ水溶剤   | 50g (前日、3回) |
|       | ストロビードライフロアブル   | 50g (前日、3回) |
| 対象病害虫 | 黒斑病・輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類   |             |
| 散布量   | 10a 当り：450ℓ以上   |             |
| 注意事項  | <ol style="list-style-type: none"> <li>① 南水・あきづき等の最終散布。</li> <li>② 【代替】通常展着剤に代えてササラ 2,000 倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。</li> </ol> |             |

## 【無袋】8月下旬の薬剤散布（前回から10日後）

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 散布時期  | 8月25日～30日頃 *左記は目安となります  | ◆ 散布日：8月 日  |
| 散布薬剤  | 水   | 100ℓ        |
|       | 展着剤   | 10ml        |
|       | ダントツ水溶剤   | 50g (前日、3回) |
|       | ストロビードライフロアブル   | 50g (前日、3回) |
| 対象病害虫 | 黒斑病・輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類   |             |
| 散布量   | 10a 当り：450ℓ以上   |             |
| 注意事項  | <ol style="list-style-type: none"> <li>① 南水・あきづき等の最終散布。</li> <li>② 【代替】通常展着剤に代えてササラ 2,000 倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。</li> </ol> |             |

◆ **西洋梨**の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意して下さい。）

**【有袋】9月上中旬の薬剤散布（前回より20日後）**

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 散布時期  | 9月10日前後 ※左記は目安となります   | ◆ 散布日：9月 日 |
| 散布薬剤  | 水 100ℓ<br>展着剤 10ml<br>ダントツ水溶剤 50g（前日、3回）<br>ストロビードライフフロアブル 50g（前日、3回）         | ◆ 散布量 ℓ    |
| 対象病害虫 | 輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類  |            |
| 散布量   | 10a当り：600ℓ以上  |            |
| 注意事項  | ① ラ・フランス、バラード等の最終散布。<br>② 【代替】ストロビードライフフロアブルに代えてキノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）でもよい。 |            |

**【無袋】9月上旬の薬剤散布（前回より15日後）**

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 散布時期  | 9月5日前後 ※左記は目安となります   | ◆ 散布日：9月 日 |
| 散布薬剤  | 水 100ℓ<br>展着剤 10ml<br>ダントツ水溶剤 50g（前日、3回）<br>ベルコートフロアブル 50ml（14日前、5回） ※収穫前規制に注意   | ◆ 散布量 ℓ    |
| 対象病害虫 | 輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類   |            |
| 散布量   | 10a当り：600ℓ以上   |            |
| 注意事項  | ① バラード等の最終散布。（収穫期間：9/10～20）<br>② 【代替】ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）でもよい。<br>③ ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 |            |

**【無袋】9月中旬の薬剤散布（前回から10日後）**

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 散布時期  | 9月15日前後 ※左記は目安となります                             | ◆ 散布日：9月 日 |
| 散布薬剤  | 水 100ℓ<br>展着剤 10ml<br>ストロビードライフフロアブル 50g（前日、3回） | ◆ 散布量 ℓ    |
| 対象病害虫 | 輪紋病   |            |
| 散布量   | 10a当り：600ℓ以上                                    |            |
| 注意事項  | ① ラ・フランス等の最終防除。                                 |            |

今回の特報で今年の防除は終了となります。