

☆ 生育状況は、現状平年並みの状況です。
今後、秋姫の収穫期を迎えますが、地色の抜け具合・食味を確認し、収穫をすすめて下さい。

☆ 本年も、秋姫などの品種で「黒斑病」や「かいよう病」の発生が園地によって多い状況です。
収穫後のボルドー散布を実施し、菌密度の抑制に努めて下さい。
ボルドー散布前に徒長枝を整理し、薬剤がかかりやすい状態での散布を実施して下さい。

8/24 スモモヒメシンクイ発生状況(フェロモントラップ調査)

* ()内、前回 8/17 調査数

上今井 - 9頭(15) 草間 - 36頭(80) 一本木 - 20頭(67) 倭 - 16頭(25)

【重要】シンクイムシ類の被害果は、園外へ除去し処理をお願いします。

1. 秋姫、シナノパール等の特別散布

灰星病、シンクイムシ類の発生園は、殺菌剤・殺虫剤の特別散布を実施下さい。

- 灰星病対策 : オーシャインフロアブル 3,000倍 (前日、3回)
- シンクイ対策 : ヨーバルフロアブル 5,000倍 (前日、2回)

2. プラム、プルーン **収穫終了後** の散布

- 隣接園 (特に、今後収穫期を迎える作物) に飛散しないよう十分注意する。
- 散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行ない、薬液が残らないようにする。

・ 散布時期 : 9月上旬～ (収穫終了後)

・ 散布薬剤 :
水 100ℓ当り
アビオンE (展着剤) 100ml
ICボルドー412 3.3kg

・ 散布日 9月 日
・ 散布量 ℓ

・ 対象病害虫 : 黒斑病、かいよう病

・ 散布量 : 10a当り SS400ℓ

・ 注意事項 : ①汚れが多いので、周辺の作物へ飛散しないようにする

②黒斑病、かいよう病多発園は、ボルドー散布を14日以内の間隔で、2～3回実施する。

3. 収穫後の施肥・・・天然ボカシ肥 5袋 (10a当たり)