

# 2023年 西洋梨【無袋版】病虫害防除暦

JA 中野市営農センター

JA 中野市ナシ部会

◆ 有袋栽培専用防除暦は裏面をご覧ください。

散布日	散布時期	使用薬剤名	使用量	収穫前 使用 時期	年間 使用 回数	散布量 ℓ/10a	対象病虫害	注 意 事 項
月 日	第1回 3月下旬 (発芽前)	(水88ℓ) スプレーオイル 石灰硫黄合剤	2ℓ 10ℓ	発芽前 発芽前	— —	300	腐らん病 ハダニ類 カイガラムシ類	① 混用順:スプレーオイルに石灰硫黄合剤を加用し、よく攪拌する。 ② 石灰硫黄合剤に代えて、トップジン M 水和剤の1000倍(前日、6回)でもよい。
月 日	第2回 開花期 4月下旬	展着剤 (ハイテンパワー) サムコフロアブル 10 トップジンM水和剤	10mℓ 20mℓ 100 g	前日 前日	3回 6回	300	腐らん病 輪紋病 ケムシ類 ハマキムシ類	① 訪花昆虫に十分に注意する。 ② 赤星病対策 オンリーワンフロアブル 2,000倍(前日、3回)を加用する。
月 日	第3回 5月上旬 (前回15日後)	展着剤 (ハイテンパワー) モスピラン顆粒水溶剤 ベンレート水和剤	10mℓ 25 g 50 g	前日 前日	3回 4回	400	輪紋病 胴枯病 アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類	① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。
月 日	第4回 5月下旬 (前回15日後)	展着剤 (ハイテンパワー) トランスフォームフロアブル ジマンダイセン水和剤	10mℓ 50mℓ 200 g	前日 30日前	3回 5回	400	輪紋病 アブラムシ類 カイガラムシ類	① アブラムシ類の発生が見られる場合は今回の散布を早める。
月 日	第5回 6月上旬 (前回10日後)	展着剤 (ハイテンパワー) ダーズバン DF キノド一颗粒水和剤	10mℓ 33 g 100 g	30日前 3日前	3回 9回	500	輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	① カイガラムシ類対策 アブロードフロアブルの1000倍(30日前、2回)を加用する。 ② カメムシ類対策 ダーズバンDFに代えて、アルバリン顆粒水溶剤の2000倍(前日、3回)を使用する。
月 日	第6回 6月中旬 (前回10日後)	IC ボルドー412	3.3kg	—	—	600	輪紋病	① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。
月 日	第7回 6月下旬 (前回10日後)	IC ボルドー412 ダイアジノン水和剤 34	3.3kg 100 g	— 14日前	— 6回	600	輪紋病 シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ	① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。
月 日	第8回 7月上旬 (前回10日後)	展着剤 (ハイテンパワー) バイスロイドEW ナリアWDG	10mℓ 50mℓ 50 g	7日前 前日	2回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類	① ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。 ② ハダニ類対策:カネマイトフロアブル 1,000倍(前日、1回)を加用する。
月 日	第9回 7月中旬 (前回10日後)	展着剤 (ハイテンパワー) ベルコートフロアブル	10mℓ 50mℓ	14日前	5回	600	輪紋病	① ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。
月 日	第10回 7月下旬 (前回10日後)	展着剤 (ハイテンパワー) ダニコングフロアブル キノド一颗粒水和剤 オリオン水和剤40	10mℓ 50mℓ 100 g 100 g	前日 3日前 3日前	1回 9回 2回	600	輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ハダニ類	
月 日	第11回 8月上旬 (前回15日後) オーロラ等最終防除	展着剤 (ハイテンパワー) キノド一颗粒水和剤 イカズチ WDG	10mℓ 100 g 66 g	3日前 前日	9回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類	① キノド一颗粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル 2,000倍(14日前、5回)でもよい。なお、ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 ② ハダニ類対策 コロマイト乳剤の1,000倍(前日、1回)を加用する。
月 日	第12回 8月下旬 (前回15日後)	展着剤 (ハイテンパワー) キノド一颗粒水和剤 バリアード顆粒水和剤	10mℓ 100 g 50 g	3日前 前日	9回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類	
月 日	第13回 9月上旬 (前回15日後) バラード等最終防除	展着剤 (ハイテンパワー) ベルコートフロアブル エクシレル SE	10mℓ 50mℓ 20mℓ	14日前 前日	5回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類	① ベルコートフロアブルに代えて、キノド一颗粒水和剤 1,000倍(3日前、9回)でもよい。 ② ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。
月 日	第14回 9月中旬 (前回10日後)	展着剤 (ハイテンパワー) ストロビードライフロアブル	10mℓ 50 g	前日	3回	600	輪紋病	① ラ・フランス等の最終防除。 ② シンクイムシ対策 ダントツ水溶剤 2000倍(前日、3回)を加用する。

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル（DF）⇒顆粒水和剤（WDG）⇒水和剤

当防除暦の複製・コピーを禁止します