



9 月上旬の悪天候により全域で薬剤散布が遅れたため、すす斑・すす点病の果実感染が心配されます。今後の感染拡大防止のため、散布間隔短縮等の対策を講じてください。加えて、中生種の果実成熟に伴い炭そ病の発生が心配されます。健全果への二次感染防止のため、被害果を見つけ次第早めに園外へ除去してください。

りんご

9 月中下旬の薬剤散

◆ 散布日：9 月 日

◆ 散布量： リットル

散布時期： 9 月 15 日～25 日（前回散布から 10～15 日後） *注意事項①、②参照

散布薬剤： 水 100 リットル

展着剤 10ml

劇 ベフラン液剤 25 66ml（前日、3 回） *注意事項③、④参照

対象病害虫：すす点病・すす斑病、褐斑病、斑点落葉病・（シンクイムシ類）・（カメムシ類）

散布量：10 アール当たり 600 リットル

〔注意事項〕 *必ずお読みください。

- ① 8 月中下旬及び 9 月上旬の薬剤散布が遅れた場合は、今回の散布を上記日程より早める。
- ② シンクイムシ類・カメムシ類の被害（食入害）が目立つ場合は、アルバリン顆粒水溶剤 2,000 倍（前日、3 回）を加用する。
- ③ ベフラン液剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。また、ベフラン液剤やダイパワー水和剤等成分がイミノクタジンを含む薬剤の年間使用回数は 3 回までです。使用過多に注意してください。
- ④ 炭そ病発生園は、ベフラン液剤に代えてストライド顆粒水和剤 1,500 倍（前日、3 回）でもよい。ただし、ストライド顆粒水和剤は高温時に散布すると薬害を生じる恐れがあるので、涼しい時間帯に散布する。
- ⑤ 園地の外周等死角がないように、散布量は多めに設定する。また、薬液が樹内部まで到達するように散布前に徒長枝切りや支柱立て等も適宜実施する。
- ⑥ 代替え農薬等は裏面を参考にするか、営農センター担当までお問い合わせください。（TEL23-3933）

◆ 中晩生種の栽培管理については裏面をご覧ください。

◆ 半無袋（ワックス袋）ふじの除袋について

1. 除袋時期 9月15日～20日頃までに
2. 注意点 極端な高温（強日照）が続く場合は、上記の日程より遅らせること。
園地場所や土質によっても異なりますので、詳しい時期は担当技術員までお問い合わせください。

◆ シナノスイートの収穫前管理について

1. 芯かび果除去 9月20日頃まで
 - ①異常に地色の抜けた果実の除去
 - ②早期着色果実の除去
 - ③本格的な着色期を迎える前に積極的に実施する。
2. 葉つみ方法 着色が始まったら葉つみを行なう。（着色前には行なわない）
3. 収穫予想 南部地帯10月5日頃～、北部地帯10月10日頃～

◆ シナノゴールドの収穫前管理について

1. 落果防止 ストッポール液剤1000倍
9月20日～10月5日頃に散布（展着剤は加用しない）
*落果のない場合は必要なし
*野菜や他品目には絶対かけないこと（薬害発生）
2. 収穫予想
 - 平坦部のわい化 : 10月10日頃～
 - 平坦部の普通樹 : 10月15日頃～
 - 450m以上のわい化 : 10月20日頃～
 - 450m以上の普通樹 : 10月25日頃～

～ りんご収穫前規制と使用回数 ～（詳しくは下記を確認してください。）

収穫前規制が長い有機リン剤や有機銅・キャプタンを含む剤を使用する場合は注意しましょう。

	農薬名	収穫前規制	使用回数		農薬名	収穫前規制	使用回数	
殺菌剤	ダイパワー水和剤	14日前	*3回	殺虫剤	サイアノックス水和剤	45日前	2回	
	オキシラン水和剤	14日前	4回		ダズバンDF（劇物）	14日前	2回	
	キノンドーフロアブル	14日前	4回		バイスロイドEW（劇物）	7日前	4回	
	キノンドー水和剤80	14日前	4回		イカズチWDG（劇物）	前日	2回	
	オーソサイド水和剤80	14日前	6回		オリオン水和剤40（劇物）	前日	2回	
	アリエッティC水和剤	14日前	3回		アルバリン顆粒水溶剤	前日	3回	
	ストライド顆粒水和剤	前日	3回		バリアード顆粒水和剤（劇物）	前日	3回	
	ベフラン液剤25（劇物）	前日	*3回		サムコルフロアブル10	前日	3回	
	フリントフロアブル25	前日	4回		フェニックフロアブル	前日	2回	
	ストロビードライフフロアブル	前日	3回		ディアナWDG	前日	2回	
	ナリアWGD	前日	3回		殺ダニ剤	オマイト水和剤	3日前	1回
	ベンレート水和剤	前日	4回			カネマイトフロアブル	7日前	1回
	トップジンM水和剤	前日	6回			コロマイト乳剤	前日	1回
	ファンタジスタ顆粒水和剤	前日	3回			マイトコーネフロアブル	前日	1回
フルーツセイバーフロアブル	前日	3回	ダニサラバフロアブル	前日		2回		
			ダニゲッターフロアブル	前日		1回		
			スターマイトフロアブル	前日	1回			

*開花期以降の使用回数