

りんご中生種栽培管理について

J A 中野市営農センター

下記の内容を良く読み、収穫にむけた栽培管理を徹底してください。栽培地域や土壌条件（排水性）等の外的要因でも管理内容が変わってきます。詳細につきましては営農センターまでお問い合わせください。

[千秋]の管理について

1. 除袋時期	8 月末頃～9 月初旬頃まで
2. 落果防止	ストッポール液剤 1000 倍 8 月 30 日頃に散布（展着剤は加用しない） ＊きゅうりなど野菜や他品目には絶対かけないこと（薬害発生）
3. 収穫予想	9 月 22 日頃～

[秋映]の管理について

1. 葉摘み法	9 月 10 日過ぎに果実密着葉のみ軽く摘む （葉の跡がつかない程度の軽い葉摘み）
2. 落果防止	ストッポール液剤 1000 倍 9 月 10 日頃に散布（展着剤は加用しない） ＊きゅうりなど野菜や他品目には絶対かけないこと（薬害発生）
3. 解禁予想	10 月 1 日頃 収穫解禁日を設定します。それまでは収穫はしないこと。

[ジョナゴールド]、[世界一]の管理について

1. 除袋時期	9 月 10 日～15 日頃までに
2. 落果防止	ストッポール液剤 1000 倍 9 月 10 日頃に散布（展着剤は加用しない） ＊きゅうりなど野菜や他品目には絶対かけないこと（薬害発生）
3. 収穫予想	[ジョナゴールド]：10 月 3 日頃～ [世界一]：9 月 30 日頃～

- ◇ 落果防止剤の「ストッポール液剤」は、土壌乾燥条件では効果が低下します。今後の天候にもよりますが乾燥状態が続く場合は、適度なかん水を実施し、園内の湿度を上昇させてから散布しましょう。
- ◇ 落果防止剤ストッポール液剤は収穫開始予定日の 15～25 日前に 1 回散布を基本とする。また、展着剤使用しないこと。（登録内容は収穫 7 日前まで）

[紅玉]の管理について

1. 落果防止	ストッポール液剤 1000 倍 9 月 10 日頃に散布（展着剤は加用しない） ＊きゅうりなど野菜や他品目には絶対かけないこと（薬害発生）
2. 収穫予想	10 月 5 日頃～

[半無袋（ワックス袋）ふじ]の除袋について

1. 除袋時期	9 月 15 日～20 日頃までに
2. 注意点	極端な高温（強日照）が続く場合は、上記の日程より遅らせること。 園地場所や土質によっても違いますので、詳しい時期は営農センターまでお問い合わせください。

[シナノスイート]の管理について

1. 芯かび果除去	8 月下旬～9 月 20 日頃 ①異常に地色の抜けた果実の除去 ②早期着色果実の除去 ③本格的な着色期を迎える前に積極的に実施する。
2. 葉つみ方法	着色が始まったら葉つみを行なう。（着色前には行なわない）
3. 収穫予想	10 月 10 日頃～

[シナノゴールド]の管理について

1. 落果防止	ストッポール液剤 1000 倍 9 月 20 日～10 月 5 日頃に散布（展着剤は加用しない） ＊落果のない場合は必要なし ＊きゅうりなど野菜や他品目には絶対かけないこと（薬害発生）
2. 収穫予想	平坦部のわい化：10 月 10 日頃 平坦部の普通樹：10 月 20 日頃 450m 以上のわい化：10 月 20 日頃 450m 以上の普通樹：10 月 25 日頃