

サクランボ特報 No 2

平成 28 年 4 月 8 日

J A 中野市営農センター

J A 中野市サクランボ部会

4 月初旬の高温により生育が一気に進み、発芽は昨年よりも 1 日早く確認され、開花は昨年よりも 2～3 日程度早いと予想されます。園内をよく確認して適期作業と防除に努めましょう。

佐藤錦	平年	H23	H24	H25	H26	H27	H28
発芽日	4/5	4/12	4/10	4/2	4/5	4/2	4/1
開花日	4/24	4/29	4/25	4/18	4/24	4/19	4/17?

凍霜害が心配されますので、防霜対策は万全を期して下さい。

* 防 除

- ・隣接する園地や他作物にかからないようにする。

散布時期 : 開花直前 (4 月中旬～)

散布薬剤 : 水 100ℓ
展着剤 10ml
オンリーワンフロアブル 50ml (収穫前日、3 回)

散布量 : 10a 当り 350ℓ

適用病虫害 : 灰星病・炭そ病

散布日	4 月	日
散布量		ℓ

* ハマキムシ類 (ケムシ類) の発生がある場合、フェニックスフロアブル 4000 倍 (前日、2 回) を加用散布する。

* オンリーワンフロアブルに代えてベルコートフロアブル 1000 倍 (7 日前、3 回) でもよい。

* 開花期は天候不順になりやすく、結実が心配されます。人工受粉 (相互交配) は必ず実施しましょう。

・雨除けハウスで、放花昆虫を放飼される方はハウスの屋根もしくはサイド面の網・ビニールは必ず開けておくようにして下さい。(放花昆虫保護のため)

* 防除の際、隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へ連絡して下さい。