

サクランボ特報 No. 6

6 月 5 日頃に梅雨入りとなりましたが、少雨状態が続いております。今後の天候によって、ショウジョウバエ類、灰星病等の発生が心配される場合は、特別散布により対応下さい。

特に、最後に農薬散布してから 15 日以上経過している園地は下記の農薬から使用回数に注意して薬剤を選択し、防除を実施してください。

1. 晩生種特別散布（6 月中旬）

* 散布薬剤(水 100 ℓ 当り)

・散布日 6 月 日 ・散布量 ℓ

オーシャインフロアブル 33ml (前日、5 回)

アーデントフロアブル 50ml (前日、3 回)

* 散布量：10a 当り SS 500ℓ 動噴 600ℓ

* 対象病虫害：灰星病、ショウジョウバエ

2. 特別散布実施済みの場合

* 使用回数に注意して薬剤を選択すること。

灰星病対策

農薬名	倍率	水 100ℓ 当り使用量	収穫前規制・使用回数
オンリーワンフロアブル	2,000 倍	50ml	収穫前日まで・3 回以内
オーシャインフロアブル	3,000 倍	33ml	収穫前日まで・5 回以内
アミスター10 フロアブル	1,000 倍	100ml	収穫前日まで・3 回以内

ショウジョウバエ対策

農薬名	倍率	水 100ℓ 当り使用量	収穫前規制・使用回数
テルスターフロアブル	3,000 倍	33ml	収穫前日まで・2 回以内
ディアナ WDG	10,000 倍	10g	収穫前日まで・2 回以内
アーデントフロアブル	2,000 倍	50ml	収穫前日まで・3 回以内

農作物の盗難にご注意ください！！

管内にて、農作物の盗難が発生しております。

- ・昼夜を問わず園地から離れる場合は、出入り口の施錠を徹底しましょう。
- ・ハウスの外周にダンボールを敷く（足跡が残るため侵入者が警戒）、センサーライトを設置する等、防犯対策を講じましょう。

栽培日誌は、必ず提出をお願いします（出荷前）