

もも・ネクタリン特報

【定期散布】

- ・隣接する園地や収穫中の作物に飛散しないよう十分注意する。
- ・ももとネクタリンの混植園は、ネクタリンの防除を実施する。

もも

第10回 定期防除

散布時期：第9回散布から15日以内（7月21日～7月31日頃）
＊除袋間近な場合は、除袋後に散布を実施する。



散布薬剤：	水	100ℓ	
	展着剤	20ml	
	ベルコートフロアブル	50ml	（前日、3回）
	アーデントフロアブル	50ml	（前日、3回）

散布日	7月	日
散布量		ℓ

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、（モモハモグリガ）、（アザミウマ類）
10a 当り散布量：600ℓ

- 【注意事項】
- ① ハダニ類の発生園は、コロマイト乳剤の1,000倍（7日前、1回）を加用する。
 - ② モモハモグリガの発生園は、ノーモルト乳剤の2,000倍（前日、2回）を加用する。

ネクタリン

第10回 定期防除

散布時期：第9回散布から15日以内（7月21日～7月31日頃）

散布薬剤：	水	100ℓ	
	展着剤	20ml	
	ベルコートフロアブル	50ml	（前日、2回）
	アーデントフロアブル	50ml	（前日、3回）

散布日	7月	日
散布量		ℓ

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、（モモハモグリガ）
10a 当り散布量：600ℓ

- 【注意事項】
- ① ハダニ類の発生園は、コロマイト乳剤の1,000倍（7日前、1回）を加用する。
 - ② モモハモグリガの発生園は、ノーモルト乳剤の2,000倍（前日、2回）を加用する。

裏面には、生育情報と除袋目安、腐敗病防除対策が掲載されております。

熟度優先の収穫を心掛けましょう。（果肉先行）

また、今後の品種の成熟は昨年より 3～5 日程度早いと予想されます。除袋・反射マルチ・葉摘み等の管理作業は、遅れないように進めましょう。

1. H28 収穫始め予想 （7/11 現在）

直前の気象条件により前後します。下表を参考に、果実の状況を見て収穫適期を判断しましょう

品種名	南部地区	平岡地区
白鳳	7 / 2 0 ～	7 / 2 2 ～
あかつき	7 / 2 3 ～	7 / 2 5 ～
山根白桃	8 / 5 ～	8 / 7 ～
なつっこ	8 / 4 ～	8 / 6 ～
晶光(ネクタリン)	7 / 2 2 ～	7 / 2 7 ～

2. 除袋目安・・・平岡地区を基準としています。

*あくまで目安ですので、園地状況を確認し、試し除袋してから作業に入りましょう。

品種	除袋 目安	
あかつき、なつっこ	収穫 8～10 日前	あかつきは早急に除袋。なつっこ 7/25 頃までに。
山根白桃、白桃系	収穫 12～14 日前	山根 7/24 頃までに。
川中島白桃、黄金桃	収穫 8～10 日前	川中島白桃 8/10 頃までに。 黄金桃 8/10 頃までに。

3. 果実腐敗防止対策 降雨が続く場合、系統の違う剤を輪番で使用する。（下表）

灰星病の耐性菌出現を回避するため同一系統の薬剤を連用せず、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

	薬剤の系統	薬剤名	使用濃度	適正使用基準	使用上の注意事項
もも	エルゴステロール 生合成阻害剤（E B I）	スコア顆粒水和剤 アンビルフロアブル オーシャインフロアブル インダーフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 1000倍 2000倍 5000倍 2000倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（4回） 収穫前日まで（3回）	1. ベルクート剤は、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール 1000、ダコレート水和剤は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
	そ の 他	ロブラール水和剤 ベルクートフロアブル ダコニール 1 0 0 0	1 5 0 0 倍 2 0 0 0 倍 1 0 0 0 倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（6回）	
ネクタリン	エルゴステロール 生合成阻害剤（E B I）	スコア顆粒水和剤 アンビルフロアブル オーシャインフロアブル インダーフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 1000倍 2000倍 5000倍 2000倍	収穫前日まで（2回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（4回） 収穫前日まで（3回）	1. ベルクート剤は、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール 1000、ダコレート水和剤は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
	そ の 他	ロブラール水和剤 ベルクートフロアブル ダコニール 1 0 0 0	1 5 0 0 倍 2 0 0 0 倍 1 0 0 0 倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（2回） 収穫前日まで（2回）	