

もも・ネクタリン特報

H29. 4. 21 No. 3
J A 中野市営農センター
J A 中野市りんご・もも部会

開花は昨年よりも 8 日遅く、ほぼ平年並みの状況です。(平岡地区で 4/18~20) 地域差がありますので園内の生育状況をよく確認し、防除並びに管理作業は遅れないよう計画的に進めましょう。

前回のボルドー散布以降、梅雨明けまでせん孔細菌病の重点防除期間です。散布時期を厳守し、併せて春型枝病斑の除去を実施しましょう。また、アブラムシ類の初期発生が見られる場合は、下記を参考に殺虫剤を追加して散布下さい。尚、農薬散布の際は、訪花昆虫保護のため早朝散布に努めましょう。

もも・ネクタリン せん孔病対策

せん孔細菌病の発生が心配される園地では、通常展着剤に代えて固着性展着剤アビオン E の 1,000 倍を使用する。

*アビオン E に代えて、KK ステッカーの 3,000 倍でもよい。*KK ステッカーは調合液を攪拌させながら、最後に加用する。

もも

2 回分の防除を掲載しています (通常散布、せん孔病対策 共通)

⇒他作物へ飛散しないよう十分注意する。モモとネクタリンの混植園ではネクタリン防除を実施する。

第3回 定期防除

散布時期：前回散布から 10~14 日後 (落花後)。 4 月 27 日~5 月 5 日頃

散布薬剤：	水	100%
	展着剤	10ml
	トレノックスフロアブル	200ml (7 日前、5 回)
	サムコルフロアブル 10	20ml (前日、2 回)
	アグレプト水和剤	100g (60 日前、2 回)

散布日	月	日
散布量		リットル

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、灰星病、モモハモグリガ、ハマキムシ類

10a 当り散布量： 350%

【 注意事項 】 ★★ 重要 ★★

- ①アブラムシ類の発生園は、ウララ DF の 2000 倍 (14 日前、2 回) を加用する。
- ②サムコルフロアブルに代えて、フェニックスフロアブルの 4000 倍 (前日、2 回) でもよい。
- ③うどんこ病の発生が心配される場合は、トレノックス F に代えてオンリーワンフロアブルの 2000 倍 (前日、3 回) を使用する。

第4回 定期防除

散布時期：第 3 回散布から 10 日後。 5 月 7 日~15 日頃

散布薬剤：	水	100%
	展着剤	10ml
	アプロードフロアブル	100ml (14 日前、3 回)
	ストロビードライフロアブル	50g (前日、3 回)
Ⓢ	モスピラン顆粒水溶剤	25g (前日、3 回)・・・ご購入の際、印鑑が必要です
	アグリマイシン-100	66g (60 日前、2 回)

散布日	5 月	日
散布量		リットル

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、灰星病、うどんこ病、モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類、カイガラムシ

10a 当り散布量： 400%

【 注意事項 】 ★★ 重要 ★★

- ①アグリマイシン-100 に代えて、アグレプト水和剤・ストマイ液剤 20 の 1,000 倍 (60 日前、2 回) でもよい。
*アグリマイシン、アグレプト水和剤、ストマイ液剤の使用回数は合計で 2 回まで とする。
*アグリマイシン等は、収穫 60 日前までの登録のため、極早生種 (たまき、赤宝等) への散布時は注意する。
- ②うどんこ病の発生がない園地では、ストロビー DF に代えて、トレノックスフロアブルの 500 倍 (7 日前、5 回) を散布してもよい。

次頁にはネクタリンの防除が掲載されております。必ずご覧ください

第3回 定期防除

散布時期：前回散布から 10～14 日後（落花後）。4 月 27 日～5 月 5 日頃

散布薬剤：	水	1 0 0 ℓ	
	展着剤	1 0 ml	
	トレノックスフロアブル	2 0 0 ml	（3 0 日前、5 回）
	サムコルフロアブル 1 0	2 0 ml	（3 日前、2 回）
	マイコシールド	6 6 g	（2 8 日前、5 回）

散布日	月	日
散布量		ℓ

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、灰星病、モモハモグリガ、シンクイムシ類、ハマキムシ類

10 a 当り散布量： 3 5 0 ℓ

【 注意事項 】 ★★ 重要 ★★

- ①アブラムシ類の発生園は、ウララ D F の 2000 倍（7 日前、2 回）を加用する。
②サムコルフロアブルに代えて、フェニックスフロアブルの 4000 倍（前日、2 回）でもよい。
③うどんこ病の発生が心配される場合は、トレノックス F に代えてオンリーワンフロアブルの 2000 倍（前日、3 回）を使用する。

第4回 定期防除

散布時期：第 3 回散布から 10 日後。5 月 7 日～15 日頃

散布薬剤：	水	1 0 0 ℓ	
	展着剤	1 0 ml	
	トレノックスフロアブル	2 0 0 ml	（3 0 日前、5 回）
	アプロードフロアブル	1 0 0 ml	（7 日前、2 回）
劇	モスピラン顆粒水溶剤	2 5 g	（3 日前、3 回）・・・ご購入の際、印鑑が必要です
	マイコシールド	6 6 g	（2 8 日前、5 回）

散布日	5 月	日
散布量		ℓ

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、灰星病、シンクイムシ類、モモハモグリガ、アブラムシ類、カメムシ類、カイガラムシ

10 a 当り散布量： 4 0 0 ℓ

【 注意事項 】 ★★ 重要 ★★

- ①うどんこ病の発生が心配される場合は、トレノックス F に代えてストロビー D F の 2000 倍（前日、3 回）を使用する。

◎落花期以降の追肥・葉面散布について

例年、落花後の樹勢衰弱や葉色の薄い園地が散見されます。追肥・葉面散布を実施し、健全な葉の育成と光合成、初期肥大促進に努めましょう。

*追肥の場合

資材名	保証成分量	10 a 施用量	使用時期	規格	1 袋 単価
アミノシャープ 085	N-10%、P-8%、K-5%、Mg -2%	1 ～ 2 袋	5 月中～下旬	20 k g	2, 897 円
プレシャス有機	N-7%、P-3%、K-1%	1 ～ 2 袋	5 月中～下旬	20 k g	3, 352 円

*葉面散布の場合・・・定期散布時に農薬と混用が可能です。

資材名	保証成分量	目的	倍率	使用時期	規格	100ℓ 散布 単価
ようゆう 葉友	N-5%、P-0.1%、K-0.3%	光合成促進	2, 000 倍	今回定期散布～3 回	1 ℓ	201 円
					4 ℓ	193 円
ビビッドグリーン	N-7%、P-6%、K-4%、Mg -1%	葉色、健全葉維持	500 倍	今回定期散布～3 回	1. 2kg	233 円
液体硫酸マンガン	水溶性マンガン 13. 5%	マンガン欠乏対策	200 倍	落花 30 日後 落花 40 日後の 2 回	1kg	511 円
グリーンデイズ	Mg -16%、Mn -9%、B-2. 5%	苦土欠乏対策 微量要素補給	1, 000 倍	今回定期散布～3 回	1kg	149 円

*N-窒素、P-リン酸、K-カリ、Mg -苦土、Mn -マンガン、B-ホウ素