

プラム・ブルーン特報 No. 3

平成 29 年 4 月 21 日
J A 中野市営農センター
J A 中野市プラム部会

4 月上中旬の気温は変動が激しいものの平均気温は平年より高めで推移し、生育は開花期で昨年より 9 日程遅い状況で経過しております。 (平岡で太陽の開花始め、4 月 16 日頃)

また、本年の開花状況は、平年より遅いため地域間差は狭いですが、品種間差は例年並みに開いています。

今後、落花期の防除は黒斑病・かいよう病対策として重要ですので、落花後の農薬散布が遅れないよう注意しましょう。 (授粉作業、凍霜害対策は万全に！！)

落花後の散布目安 (品種により差があります)

(南部 4/26 頃から * 北部 4/29 頃から)

薬剤散布 * 他作物にはかからないようにする。

プラム 散布時期: 落花後～5 月初旬 散布薬剤: 水 100ℓ当り 展着剤 10mℓ オーシャインフロアブル 33mℓ (前日、3回) マイコシールド 50g (21日前、3回)	・ 散布日 4 月 日
	・ 散布量 ℓ
	対象病虫害: 灰星病、黒斑病、(かいよう病)
	散布量: 10a 当り SS400ℓ 動噴 500ℓ

- ①シンクイムシ類の発生がある場合はフェニックスフロアブル 4000 倍(前日、2回)を加用散布する
- ②5月末までは、葉・果実とも軟弱なため農薬散布の際は(時間帯や薬液量等)十分注意する。

ブルーン 散布時期: 落花後、5 月上旬～ 散布薬剤: 水 100ℓ当り 展着剤 10mℓ フルーツセイバー 66mℓ (前日、3回) サムコルフロアブル 10 40mℓ (3日前、3回)	・ 散布日 5 月 日
	・ 散布量 ℓ
	対象病虫害: 灰星病
	散布量: 10a 当り SS400ℓ 動噴 500ℓ

- ①スモモヒメシンクイ越冬世代成虫の発生があるため、散布の際は死角が生じないように注意する。