

生育状況は、落花で前年比 1 週間遅れに推移し、平年並みに経過しております。今後の防除については、地域、品種間差が開いておりますので、園の状況を確認してから実施して下さい。

1. 薬剤散布 隣接園（特に収穫期の作物）に飛散しないように注意して下さい

《プラム》（前回から約 10 日後目安）

・散布時期：	5 月上中旬（5 月 7 日～5 月 11 日頃）	
・散布薬剤：	水 100ℓ 当り 展着剤 10ml サムコフロアブル 10 40ml（3 日前、3 回） ウララ DF 50g（7 日前、2 回） アグレプト水和剤 100g（30 日前、2 回）	・散布日 5 月 日 ・散布量 ℓ
・対象病害虫：	ケムシ類、シンクイムシ類、アブラムシ類、黒斑病（かいよう病）	
・散布量：	10a 当り SS400ℓ 動噴 500ℓ	
・注意事項	①5 月末までの農薬散布は、葉、果実とも軟弱であり、（時間帯・薬液量等）十分注意する。 ②アグレプト水和剤、アグリマイシン - 100 の剤はぶどうにかかると種無し果を生じるので隣接園に掛からないようにする。	

次回の散布（前回から約 10 日後目安）

・散布時期：	5 月中下旬（5 月 17 日～5 月 21 日頃）	
・散布薬剤：	水 100ℓ 当り 展着剤 10ml アプロードフロアブル 100ml（14 日前、2 回） モスピラン顆粒水溶剤 25g（前日、3 回） アグレプト水和剤 100g（30 日前、2 回）	・散布日 5 月 日 ・散布量 ℓ
・対象病害虫：	シンクイムシ類、アブラムシ類、カイガラムシ類幼虫、黒斑病（かいよう病）	
・散布量：	10a 当り SS400ℓ 動噴 500ℓ	
・注意事項	①5 月末までの農薬散布は、葉、果実とも軟弱であり、（時間帯・薬液量等）十分注意する。 ②アグレプト水和剤、アグリマイシン - 100 の剤はぶどうにかかると種無し果を生じるので隣接園に掛からないようにする。	

《ブルーン》（前回から約 15 日後目安）

・散布時期：	5 月中下旬（5 月 17 日～21 日頃）	
・散布薬剤：	水 100ℓ 当り 展着剤 10ml アプロードフロアブル 100ml（14 日前、2 回） モスピラン顆粒水溶剤 50g（前日、3 回） アグレプト水和剤 100g（30 日前、2 回）	・散布日 5 月 日 ・散布量 ℓ
・対象病害虫：	アブラムシ類、シンクイムシ類、黒斑病、かいよう病	
・散布量：	10a 当り SS400ℓ 動噴 500ℓ	
・注意事項	①アグレプト水和剤はぶどうにかかると種無し果を生じるので隣接園は注意する。 ②黒斑病の発生する場合は、再度 5 月下旬にアグレプト水和剤 1000 倍（30 日前、2 回）を散布する。	

3. 今後の管理 摘果作業（結実が判明してから）

品種では、秋姫⇒大石早生⇒菅野中生⇒貴陽⇒太陽などの順に 5 月下旬頃から

- ・予備摘果→仕上げ摘果→見直し摘果
- ・園内が暗くなりやすいので新梢を整理しましょう。
- ・ふくろみ病の発生果実は翌年への越冬菌増加に繋がります。できるだけ園地外へに除去しましょう。