

前回の特報において生育が平年並みになると予想されると記載しましたが、平年より4日ほど遅い状況となっております。発芽は平年比4日遅い、昨年比9日遅い状況となっております。

4月は気象の変動が激しく、一時的な高温によって開花が早まる事があります。特に開花の早い貴陽・秋姫などは園地の状況を確認しましょう。

※地域差や品種による差があります。適期に防除できるように、園地の状況を確認しましょう。

(平岡地点)

太陽	平 年	H26	H27	H28	H29予想		
					南部	西部	北部
開花	4/14	4/17	4/12	4/6	4/13	4/16	4/19

プラム 第2回 (開花始め1～2輪咲き)

散布時期：園地で1～2輪花が咲き始めたら

薬剂量 (100㎡当り)： 水 100リットル

展着剤 10ml

ICボルドー412 3.3kg

対象病害虫：黒斑病、かいよう病

散布量：10a当り 350ℓ

注意事項

- ①展葉後の散布は薬害が著しいので、時期を厳守し他作物への飛散はしない。
- ②昨年、黒斑病・かいよう病が発生した園地は、展着剤をアビオン-Eの1000倍または、K・Kステッカー3000倍を使用する。*K・Kステッカーを使用する場合は最後に入れ、良く攪拌させましょう。
- ③菅野中生や秋姫の黒斑病、かいよう病発生園の展着剤は、6月上旬までアビオン-Eの1,000倍を使用する。

プルーン 第2回は落花直後（5月上旬頃）なので次回掲載予定