

もも・ネクタリン特報

H29. 5. 17 No. 4
J A 中野市営農センター
J A 中野市りんご・もも部会

もも・ネクタリン せん孔病対策

せん孔細菌病の発生が心配される園地では、通常展着剤に代えて固着性展着剤アビオンEの1,000倍を使用する。

*アビオンEに代えて、KKステッカーの3,000倍でもよい。*KKステッカーは調合液を攪拌させながら、最後に加用する。

もも

2回分の防除を掲載しています

⇒他作物へ飛散しないよう十分注意する。モモとネクタリンの混植園ではネクタリン防除を実施する。

第5回 定期防除

下記のいずれかを選択して散布を実施ください

散布日	5月	日
散布量		リットル

通常散布

散布時期：5月20～26日(前回から10日後)

散布薬剤：	水	100ℓ
	展着剤	10ml
	フルーツセイバー	50ml
	劇 ハチハチフロアブル	50ml
	マイコシールド	66g

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、灰星病、(うどんこ病)
モモハモグリガ、アブラムシ類

10a 当り散布量： 500ℓ

カイガラムシ類対策 強化

散布時期：5月20～26日(前回から10日後)

散布薬剤：	水	100ℓ
	展着剤	10ml
	フルーツセイバー	50ml
	コルト顆粒水和剤	50g
	マイコシールド	66g

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、灰星病、(うどんこ病)
アブラムシ類、カイガラムシ類

10a 当り散布量： 500ℓ

注意事項：フルーツセイバーに代えて、トレノックスフロアブルの500倍(7日前、5回)でもよい

第6回 定期防除

下記のいずれかを選択して散布を実施ください

散布日	月	日
散布量		リットル

通常散布

散布時期：6月4～10日(第5回から15日後)

散布薬剤：	水	100ℓ
	展着剤	20ml
	劇 デランフロアブル	100ml
	アルバリン顆粒水溶剤	50g

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、(灰星病)、(ホモブシス腐敗病)、モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類

10a 当り散布量： 500ℓ

せん孔細菌病対策 強化

散布時期：5月30～6月5日(第5回から10日後)

散布薬剤：	水	100ℓ
	展着剤	20ml
	劇 デランフロアブル	100ml
	アルバリン顆粒水溶剤	50g
	マイコシールド	66g

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、(灰星病)、(ホモブシス腐敗病)、モモハモグリガ、アブラムシ類、シンクイムシ類

10a 当り散布量： 500ℓ

【 もも 農薬使用基準 (第5回～第6回) 】 ()内は収穫前規制および使用回数

フルーツセイバー (前日、3回)、ハチハチフロアブル (前日、2回)、マイコシールド (21日前、5回)

コルト顆粒水和剤 (前日、3回)、デランフロアブル (7日前、4回)、アルバリン顆粒水溶剤 (前日、3回)

次頁にはネクタリンの防除が掲載されております。必ずご覧ください

第5回 定期防除

散布時期：5 月 20 日～26 日（前回散布から 10 日後）

散布薬剤： 水 1 0 0 リットル
展着剤 1 0 ml
トレノックスフロアブル 2 0 0 ml （3 0 日前、5 回）
劇 ハチハチフロアブル 5 0 ml （前日、2 回）
マイコシールド 6 6 g （2 8 日前、5 回）

散布日 5 月 日
散布量 リットル

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、灰星病、（うどんこ病）、モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類

10 a 当り散布量： 5 0 0 リットル

【 注意事項 】 ★★ 重要 ★★

- ①うどんこ病の発生が心配される場合は、トレノックスFに代えてフルーツセイバーの 2000 倍（前日、3 回）を使用する。
②カイガラムシ類の発生園は、ハチハチフロアブルに代えてコルト顆粒水和剤 2000 倍（前日、3 回）を使用する。

第6回 定期防除

散布時期：5 月 30 日～6 月 5 日（第 5 回散布から 10 日後）

散布薬剤： 水 1 0 0 リットル
展着剤 2 0 ml
劇 デランフロアブル 1 0 0 ml （1 4 日前、2 回）
アルバリン顆粒水溶剤 5 0 g （前日、3 回）
マイコシールド 6 6 g （2 8 日前、5 回）

散布日 月 日
散布量 リットル

対象病害虫：せん孔細菌病、黒星病、（灰星病）、（ホモブシス腐敗病）
シンクイムシ類、モモハモグリガ、アブラムシ類、カメムシ類

10 a 当り散布量： 5 0 0 リットル

劇 マークの農薬をご購入の際は、印鑑をご持参ください

◎樹勢が弱い場合、葉色が薄い場合は、葉面散布・追肥により改善を図りましょう

落花後の樹勢衰弱や葉色の薄い園地が散見されます。追肥・葉面散布を実施し、健全な葉の育成と光合成、初期肥大促進に努めましょう。

*追肥の場合

資材名	保証成分量	10 a 施用量	使用時期	規格	1 袋 単価
アミノシャープ 085	N-10%、P-8%、K-5%、Mg -2%	1 ～ 2 袋	5 月中～下旬	20 k g	2, 897 円
プレシャス有機	N-7%、P-3%、K-1%	1 ～ 2 袋	5 月中～下旬	20 k g	3, 352 円

*葉面散布の場合・・・定期散布時に農薬と混用が可能です。

資材名	保証成分量	目的	倍率	使用時期	規格	100ℓ 散布 単価
ようゆう 葉友	N-5%、P-0.1%、K-0.3%	光合成促進	2, 000 倍	今回定期散布～3 回	1 ℓ	201 円
					4 ℓ	193 円
ビビッドグリーン	N-7%、P-6%、K-4%、Mg -1%	葉色、健全葉維持	500 倍	今回定期散布～3 回	1. 2kg	233 円
液体硫酸マンガン	水溶性マンガン 13. 5%	マンガン欠乏対策	200 倍	落花 30 日後 落花 40 日後の 2 回	1kg	511 円
グリーンデイズ	Mg -16%、Mn -9%、B-2. 5%	苦土欠乏対策 微量要素補給	1, 000 倍	今回定期散布～3 回	1kg	149 円

*N-窒素、P-リン酸、K-カリ、Mg-苦土、Mn-マンガン、B-ホウ素