



- ◆生育状況はぶどうセンター周辺で展葉 5～6 枚（5/17 日現在）。生育状況は平年並みです。
- ◆ストマイ散布前には花穂に薬液がかかりやすいように新梢の誘引を実施しましょう。
- ◆乾燥傾向です、若木を中心にかん水を実施しましょう。また、若木の複数発芽している芽は整理を実施しましょう。

| ぶどうセンター付近<br>露地生育状況 | 展 葉 期 | 開 花 期   | 満 開 期   | 落 花 期   |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|
| 平 年                 | 5月1日  | 6月 8日   | 6月11日   | 6月14日   |
| 昨 年                 | 4月25日 | 5月28日   | 6月 2日   | 6月 5日   |
| 本 年（巨峰）             | 5月2日  | 6月 8日頃？ | 6月11日頃？ | 6月14日頃？ |
| 本 年（シャインマスカット）      | 5月5日  | 6月11日頃？ | 6月14日頃？ | 6月17日頃？ |

## 【第3回ぶどう薬剤散布】

| 散布時期                            | 展葉 9 枚頃（5/25～6/1 頃、または 前回から10日後）                                                                                    |               |     |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|---|
| 散布薬剤                            | 水                                                                                                                   | 100ℓ          | 散布日 | 月 | 日 |
|                                 | 展着剤（ハイテンパワー）                                                                                                        | 10mℓ          | 散布量 | ℓ |   |
|                                 | ドーシャスフロアブル                                                                                                          | 50mℓ（60日前、3回） |     |   |   |
|                                 | ※有核巨峰は【マルポロン 100g（花振り防止）】                                                                                           |               |     |   |   |
|                                 | ※種なしは【ビックマグ 100g（葉の健全化）】                                                                                            |               |     |   |   |
| または【グリーンデイズ 100g（葉の健全化、微量要素補給）】 |                                                                                                                     |               |     |   |   |
| ※は葉面散布剤です。天候不順対策として入れて下さい。      |                                                                                                                     |               |     |   |   |
| 散布量                             | 10a 当り 300ℓ 死角のないように散布                                                                                              |               |     |   |   |
| 適用病害虫                           | 晩腐病・べと病・黒とう病                                                                                                        |               |     |   |   |
| 注 意 点                           | ① アブラムシ等の害虫発生がある場合はアディオン水和剤 2,000 倍（7 日前まで、5 回）を散布する。<br>② 日中の高温時の散布は避け、気温が低く、風のない時に散布をする。<br>③ 葉の表裏にしっかりかかるよう散布する。 |               |     |   |   |

## 【第4回ぶどう薬剤散布】（※今回からは 10a 当りの散布量が 400ℓ です）

| 散布時期                            | 開花3日前（6/5～6/1 1日頃）または 前回から10日後                                         |               |     |     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
| 散布薬剤                            | 水                                                                      | 100ℓ          | 散布日 | 月 日 |
|                                 | 展着剤（ハイテンパワー）                                                           | 10ml          | 散布量 | ℓ   |
|                                 | フルーツセイバー                                                               | 66ml（7日前・3回）  |     |     |
|                                 | オーソサイド水和剤80                                                            | 125g（45日前・2回） |     |     |
|                                 | オルトラン水和剤                                                               | 66g（60日前・1回）  |     |     |
|                                 | ※有核巨峰は【マルポロン 100g（花振り防止）】                                              |               |     |     |
|                                 | ※種なしは 【ビックマグ 100g（葉の健全化）】                                              |               |     |     |
| または【グリーンデイズ 100g（葉の健全化、微量要素補給）】 |                                                                        |               |     |     |
| 散布量                             | 10a当り 400ℓ 以上 死角のないようたっぷり散布する                                          |               |     |     |
| 適用病害虫                           | べと病・灰色かび病・晩腐病・褐斑病・黒とう病・スリップス類・フタテンヒメヨコバイ                               |               |     |     |
| 注意点                             | ※今回から10aあたりの散布量が400ℓ になるので注意する。                                        |               |     |     |
|                                 | ① オルトラン水和剤は果樹類に登録が少ないため、隣接園に飛散しないよう注意する。                               |               |     |     |
|                                 | ② 灰色かび病の発生園はゲッター水和剤 1,500 倍（45 日前まで、1 回）を散布する。                         |               |     |     |
|                                 | ③ アリエッティ C 水和剤とオーソサイド水和剤 80 の一成分が同一のため、散布回数に注意（合計 2 回まで）               |               |     |     |
|                                 | ④ シャインマスカット園で昨年ハダニの発生があった園は、カネマイトフロアブル 1,000 倍（収穫 14 日前まで、1 回）を加用散布する。 |               |     |     |

※隣接園（特に収穫期の作物）に飛散しないように注意してください。

※防除の際、隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へ連絡してください。

次頁にストマイ・フラスター特報あり

(種なしぶどう関係)

【ストマイ液剤の散布（種なしぶどうのみ散布）】

|      |                                                                                                                                                                                                   |          |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| 散布目的 | 無種子化（散布遅れに注意！）                                                                                                                                                                                    |          |     |     |
| 散布時期 | 満開 14 日前～開花始期まで 5 月 25 日 ～ 6 月 1 日頃                                                                                                                                                               |          |     |     |
| 使用濃度 | 水                                                                                                                                                                                                 | 1 0 0 ℓ  | 散布日 | 月 日 |
|      | 展着剤                                                                                                                                                                                               | 1 0 ml   | 散布量 | ℓ   |
|      | ストマイ液剤 2 0                                                                                                                                                                                        | 1 0 0 ml |     |     |
| 散布量  | 1 0 a 当り 3 0 0 ℓ                                                                                                                                                                                  |          |     |     |
| 注意点  | ①種なしぶどうは必ず散布する（生育が早いため、散布遅れに注意する！）<br>②花穂にしっかり当るよう、散布前には誘引を実施する！<br>③有核ぶどうには絶対にかからないように注意する<br>④種なし巨峰とシャインマスカットの混植園は開花時期が違うので、ストマイの散布時期に注意する。<br>⑤ストマイ液剤は散布時期が開花期に近づくほど効果が低くなります。散布遅れがないよう注意して下さい |          |     |     |

【フラスター散布（有核・種なし）】

|      |                                                                                                                                                                      |      |                  |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----|
| 散布目的 | 着粒安定・新梢伸長抑制                                                                                                                                                          |      |                  |     |
| 散布時期 | 展葉1 1枚頃（開花始期まで） 5月下旬頃 ～                                                                                                                                              |      |                  |     |
| 使用濃度 | 水                                                                                                                                                                    | 100ℓ | 散布日              | 月 日 |
|      | 展着剤（ハテパワー）                                                                                                                                                           | 10ml | 散布量              | ℓ   |
|      | フラスター液剤                                                                                                                                                              | 下記参照 |                  |     |
|      | ・有核巨峰【125～200ml】<br>・種なし巨峰【100ml】<br>・シャインマスカット【50ml】<br>・カバール、ピオーネ等（巨峰系4倍体と3倍体品種）【125～200ml】                                                                        |      |                  |     |
| 散布量  | 10a当り 100～150ℓ                                                                                                                                                       |      | 10a当り 300ℓ（露地巨峰） |     |
| 注意点  | ※品種、散布方法により使用倍率、散布時期が違います。（有核は早め、種なしは遅め）<br>※有核巨峰は【ハテパワー】に代えて【アプローチBⅠ 500倍】を使用する<br>① 散布倍率と散布量を厳守する。<br>② 花房にかかるように園全体に均一に散布する。<br>③ 農薬とは混用しない。<br>④ 日中の高温時は避けて散布する。 |      |                  |     |

☆房切りについて☆

房切りの時期が近くなってきております。このまま順調に生育が進めば早いところで 5 月末あたりから房切りが実施可能です。房切りにつきましては下記の表を参考に実施して下さい。

品種別 房切り基準、目標房重、粒数表

| 品種            | 房切り目安       | 目標粒重 | 目標房重  |
|---------------|-------------|------|-------|
| 有核巨峰          | 満開時 7.0 c m | 35 粒 | 350 g |
| 種なし巨峰         | 満開時 3.0 c m | 30 粒 | 400 g |
| シャインマスカット（5k） | 満開時 3.5 c m | 35 粒 | 550 g |
| シャインマスカット（PC） | 満開時 2.5 c m | 25 粒 | 350 g |
| ピオーネ          | 満開時 2.5 c m | 25 粒 | 400 g |
| ナガノパープル       | 満開時 3.0 c m | 30 粒 | 400 g |
| クイーンニーナ       | 満開時 3.0 c m | 30 粒 | 500 g |
| ロザリオビアンコ      | 満開時 7.0 c m | 35 粒 | 400 g |
| サニールージュ       | 満開時 6.0 c m | 40 粒 | 300 g |