



シンクイムシ類・ハダニ類が 6 月中旬から早期発生中です。盛夏期の多発を防ぐため早めの抑制対策（殺ダニ剤混用）を講じてください。また、梅雨期間は、果実腐敗性病害の感染拡大に好適な高温・多湿状態が続きます。この期間の薬剤散布が遅れると一気に病害が感染拡大します。予防散布を徹底してください。

りんご

6 月下旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

散布時期：6 月 20～25 日

散布薬剤：水

1 0 0 リットル

展着剤

1 0 ml *注意事項②参照

ダニゲッターフロアブル

5 0 ml（前日、1 回） *注意事項③参照

キノンドーフロアブル

1 2 5 ml（14 日前、4 回）

オーソサイド水和剤 8 0

1 2 5 g（14 日前、6 回）



スプラサイド水和剤

6 6 g（30 日前、2 回） *注意事項④参照

スイカル

1 0 0 g（カルシウム剤）

散布量：10a 当り 600 リットル

対象病害虫：炭疽病、輪紋病、斑点落葉病、褐斑病

ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、クワコナカイガラムシ他

➡ 散布日：6 月 日

➡ 散布量： リットル

➡ 注意事項

- ① 曇天・降雨が続く場合は、上記の目安時期より前倒して散布する。
- ② 通常展着剤（ハイテンパワー等）に代えて、機能性展着剤ササラ 2,000 倍（100 リットルに 50ml）を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果が期待できる。
- ③ **ダニゲッターフロアブルはぶどうに飛散すると新梢停止等の薬害が生じる場合があるので注意する。**
- ④ **スプラサイド水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。**
- ⑤ 炭疽病・輪紋病対策：6 月末にオキシラン水和剤 500 倍（14 日前、4 回）を特別散布する。
- ⑥ 6 月末まではサビの発生しやすい時期なので高温時の散布は避ける。
- ⑦ カルシウム剤「スイカル」は、ビターピット・果実軟化防止や果実からの油上がり予防、果実の日持ち性向上、新梢の徒長抑制などに効果があるので、必要により加用する。尚、スイカルに代えてストピットⅡの 500 倍を使用してもよい。

◆ 次回（7 月上旬）薬剤散布予定：7/5～10

梅雨最盛期の褐斑病・炭そ病やシンクイムシ類対象の薬剤散布です。

◆ 次頁もお読みください。（殺ダニ剤の選択・葉面散布資材使用例記載）

りんご殺ダニ剤の選択について

○：効果ある △：効果やや劣る ×：効果ない

薬剤名	倍率	使用基準	使用回数	IRACコード	種類に対する効果		ステージに対する効果		
					リンゴハダニ	ナミハダニ	卵	幼若虫	成虫
ピラニカ水和剤	2000	21 日前	1 回	21	○	×	○	○	○
カネマイトフロアブル	1000	7 日前	1 回	20	○	○	○	○	○
マイトコーネフロアブル	1000	前日	1 回	20	○	○	△	○	○
オマイト水和剤	750	3 日前	1 回	12	○	○	○	○	○
コロマイト乳剤	1000	前日	1 回	6	○	○	○	○	○
ダニゲッターフロアブル	2000	前日	1 回	23	○	○	○	○	△
スターマイトフロアブル	2000	前日	1 回	25	○	○	○	○	○
ダニサラバフロアブル	1000	前日	2 回	25	○	○	○	○	○
ダニコングフロアブル	2000	前日	1 回	25	○	○	○	○	○

① 殺ダニ剤ローテーションについて（H29）

6 月下旬（6/20～25 頃）：ダニゲッターフロアブル（初期密度抑制・殺卵・殺幼虫効果あり）⇒
7 月下旬（7/20～25 頃）スターマイトフロアブル（速効的・成虫に効果あり・残効 14 日程度）⇒
8 月下旬（8/20～25 頃）：コロマイト乳剤 1,000 倍（速効的・成虫に効果あり・残効短い）

- ② ダニゲッター（ダニサラバ）は成虫に対してやや遅効的效果を示す。散布 7 日後以降に効果が発現する。
- ③ ダニサラバ・スターマイト・ダニコングは同一薬剤系統である。抵抗性回避のため、いずれかを年 1 回のみ使用とする。
- ④ バイスロイド EW 等の合成ピレスロイド剤は、殺ダニ登録はあるが効果はほとんどないので、盛夏期のシンクイムシ類対策として使用する。（抵抗性が出現しやすいため、合成ピレスロイド剤は年 2 回の使用とする）

6 月の葉面散布資材使用例

苦土欠乏症状等改善、健全葉育成を目的に各資材を選択使用してください。（定期散布農薬と混用可能）

*N-窒素、P-リン酸、K-カリ、Mg-苦土、Mn-マンガン、B-ホウ素

商品名	保証成分量	使用目的	倍率 (倍)	価格 (円)	規格 (包装単位)	500 ㎡当り 薬剤費(円)
グリーン デイズ (おすすめ！)	水溶性苦土 16% 水溶性マンガン 9.0% 水溶性ホウ素 2.5%	苦土等補給 葉の健全化 品質向上他	1000	1,491	1 kg	745
ビックマグ	水溶性苦土 23%	苦土補給 葉の健全化	1000	1,146	1 kg	573
グリーン トップ 70	水溶性苦土 23%	苦土補給 葉の健全化	500	1,334 2,228	2 kg 5 kg	667 445
ビビット グリーン	水溶性苦土 4% 海藻エキスに NPK 配合	苦土等補給 葉の健全化 光合成促進	500	1,393 4,271 7,305	1.2 kg 5 kg 10 kg	1,160 854 730
液体硫酸 マンガン	水溶性マンガン 13.5%	マンガン補給	200	1,023	1 kg	2,558
ようゆう 葉友	N-5 %、P-0.1 %、 K-0.3% 高濃度総合アミノ酸	光合成促進 花芽充実	2000	4,039 15,444 72,749	1ℓ 4ℓ 20ℓ	1,009 965 909