

もも・ネクタリン特報

H29. 6. 16 No.6
J A 中野市営農センター
J A 中野市りんご・もも部会

もも・ネクタリン せん孔病対策

せん孔細菌病の発生が心配される園地では、通常展着剤に代えて固着性展着剤アビオンEの1,000倍を使用する。

*アビオンEに代えて、KKステッカーの3,000倍でもよい。*KKステッカーは調合液を攪拌させながら、最後に加用する。

もも

定期防除

下記のいずれかを選択して散布を実施ください

| | | |
|-----|----|------|
| 散布日 | 6月 | 日 |
| 散布量 | | リットル |

通常散布

散布時期：6月19～25日(前回から15日後)

| | |
|------------|-------|
| 散布薬剤：水 | 100ℓ |
| 展着剤 | 20ml |
| 劇 デランフロアブル | 100ml |
| 劇 ダーズバンDF | 33g |

対象病害虫：せん孔細菌病、灰星病、ホモプシス腐敗病
シンクイムシ類、ハマキムシ類、ウメシロカイガラムシ

10a当り散布量：600ℓ

せん孔細菌病対策 強化

散布時期：6月19～25日(前回から10日後)

| | |
|------------|-------|
| 散布薬剤：水 | 100ℓ |
| 展着剤 | 20ml |
| 劇 デランフロアブル | 100ml |
| 劇 ダーズバンDF | 33g |
| マイコシールド | 66g |

対象病害虫：せん孔細菌病、灰星病、ホモプシス腐敗病
シンクイムシ類、ハマキムシ類、ウメシロカイガラムシ

10a当り散布量：600ℓ

注意事項：カメムシ類の発生園は、スミチオン水和剤40の1000倍(3日前、6回)を特別散布する
劇マークの農薬をご購入の際は、印鑑をご持参ください

【もも 農薬使用基準】 ()内は収穫前規制および使用回数

デランフロアブル(7日前、4回)、ダーズバンDF(14日前、5回)、マイコシールド(21日前、5回)

ネクタリン

ネクタリンの定期散布は、もも・ネクタリン特報のNo.5をご覧ください。(6月15～25日散布予定)

【今後のせん孔細菌病対策(もも・ネクタリン共通)】

葉病斑(右図)が散見されており、今後、梅雨期の本格的な降雨により果実感染が拡大します。引き続き総合的な防除を徹底しましょう。

- ① 春型枝病斑を除去する
- ② 薬剤散布間隔10日以内を厳守する(降雨前の予防散布)
- ③ 袋掛け(本格的な梅雨を迎えるまでに)

