



## ● 和梨の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

### 【有袋】6 月下旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

|                              |                                                                                  |                                 |           |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
| 散布時期                         | 6 月 25 日～30 日     * 注意事項③参照                                                      |                                 | ◆ 散布日：6 月 | 日    |
| 散布薬剤                         | 水                                                                                | 1 0 0 リットル                      | ◆ 散布量     | リットル |
|                              | 展着剤                                                                              | 2 0 ml     * 注意事項②参照            |           |      |
|                              | ベルコートフロアブル                                                                       | 6 6 ml (14 日前、5 回)              |           |      |
|                              | ダーズバン D F (劇)                                                                    | 3 3 g (30 日前、3 回)     * 注意事項④参照 |           |      |
| 対象病害虫                        | 黒斑病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、(ハダニ類) * 注意事項②参照                                   |                                 |           |      |
| 散 布 量                        | 10 a 当り：450 リットル以上                                                               |                                 |           |      |
| 注意事項                         | ① 黒斑病対策：ロブドー水和剤 800 倍(14 日前、5 回)を加用する。                                           |                                 |           |      |
|                              | ② ハダニ類対策：カネマイトフロアブル 1,000 倍（前日、1 回）を加用する。                                        |                                 |           |      |
|                              | ③ <b>ダーズバン D F は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。</b>                                   |                                 |           |      |
|                              | ④ 通常展着剤（ハイテンパワー等）に代えて、固着性展着剤のアビオン E の 1,000 倍（100 リットル当り 100ml）を使用すると、薬液付着効果が高まる |                                 |           |      |
| (参考) 有袋 7 月上旬の薬剤散布予定：7/10～15 |                                                                                  |                                 |           |      |

### 【無袋】6 月下旬の薬剤散布（前回より 10 日後）

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 散布時期  | 6 月 20 日～25 日                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | ◆ 散布日：6 月 | 日    |
| 散布薬剤  | 水                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 0 0 リットル         | ◆ 散布量     | リットル |
|       | 展着剤                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 0 ml             | * 注意事項④参照 |      |
|       | ベルコートフロアブル                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 6 ml (14 日前、5 回) |           |      |
|       | ダズバン D F 劇                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 3 g (21 日前、3 回)  | * 注意事項③参照 |      |
| 対象病害虫 | 黒斑病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、（ハダニ類） * 注意事項②参照                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |      |
| 散 布 量 | 10 a 当り：450 リットル以上                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |      |
| 注意事項  | ① 黒斑病対策：ロブドー水和剤 800 倍(14 日前、5 回)を加用する。<br>② ハダニ類対策：カネマイトフロアブル 1,000 倍（前日、1 回）を加用する。<br>③ ダズバン D F は劇物薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。<br>④ 通常展着剤（ハイテンパワー等）に代えて、固着性展着剤のアビオン E の 1,000 倍（100 リットル当り 100ml）を使用すると、薬液付着効果が高まる。<br>⑤ 無袋栽培の薬剤散布間隔は、今回から 7 月中旬（第 10 回）まで概ね 10 日を進める。 |                    |           |      |

### 【無袋】7 月上旬の薬剤散布（前回より 10 日後）

|       |                                                                                                                    |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 散布時期  | 7 月 1 日～5 日                                                                                                        | * 注意事項①参照         |
| 散布薬剤  | 水                                                                                                                  | 1 0 0 リットル        |
|       | 展着剤                                                                                                                | 2 0 ml            |
|       | ナリア WDG                                                                                                            | 5 0 g (前日、3 回)    |
|       | ダズバン D F 劇                                                                                                         | 3 3 g (30 日前、3 回) |
|       |                                                                                                                    | * 注意事項②参照         |
| 対象病害虫 | 黒斑病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ                                                                                      |                   |
| 散布量   | 10 a 当り：450 リットル以上                                                                                                 |                   |
| 注意事項  | <p>① <b>ナリア WDG は、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。</b></p> <p>② <b>ダズバン D F は劇物薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。</b></p> |                   |

（参考）無袋第 7 月中旬の薬剤散布予定：7/10～15

◆ 西洋梨の定期防除は次頁をご覧ください。

● **西洋梨**の定期防除（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

**【有袋】** 6月下旬の薬剤散布（前回より **15 日後**）

|       |                                                                                                                                                                                                        |          |             |                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|
| 散布時期  | 6 月 25 日～30 日頃                                                                                                                                                                                         |          |             | ◆ 散布日：6 月      日                |
| 散布薬剤  | 水                                                                                                                                                                                                      | 1 0 0 ℓ  |             | ◆ 散布量                      リットル |
|       | 展着剤                                                                                                                                                                                                    | 1 0 mℓ   |             |                                 |
|       | カネマイトフロアブル                                                                                                                                                                                             | 1 0 0 mℓ | （前日、1 回）    |                                 |
|       | ダーズバンD F <b>劇</b>                                                                                                                                                                                      | 3 3 g    | （30 日前、3 回） | * 注意事項③参照                       |
|       | オキシラン水和剤                                                                                                                                                                                               | 2 0 0 g  | （3 日前、9 回）  | * 注意事項④参照                       |
| 対象病害虫 | 輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、ハダニ類                                                                                                                                                                     |          |             |                                 |
| 散布量   | 10 アール当り：600 リットル                                                                                                                                                                                      |          |             |                                 |
| 注意事項  | <p>① 袋掛け前に実施する。</p> <p>② 輪紋病対策：袋掛けが遅れた場合は、6 月末にオキシラン水和剤 500 倍（3 日前、9 回）を特別散布する。散布時期は前回より 10 日後とする。</p> <p>③ <b>ダーズバンD F は劇物薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。</b></p> <p>④ 有機銅成分を含む薬剤の使用回数は合計で 9 回以内であるので注意する。</p> |          |             |                                 |

（参考）有袋 7 月中旬の薬剤散布予定：7/10～15（前回より 15 日後）

**【無袋】** 6月中旬の薬剤散布（前回より **10 日後**）

|       |                                                                                   |            |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 散布時期  | 6 月 20 日前後                                                                        |            |  |
| 散布薬剤  | 水                                                                                 | 1 0 0 ℓ 当り |  |
|       | I C ボルドー412                                                                       | 3. 3 kg    |  |
| 対象病害虫 | 輪紋病                                                                               |            |  |
| 散布量   | 10 アール当り：600ℓ                                                                     |            |  |
| 注意事項  | <p>① IC ボルドーに代えて、オキシラン水和剤の 500 倍（3 日前、9 回）でもよい。</p> <p>② 葉やけ防止のため涼しい時間帯に散布する。</p> |            |  |

**【無袋】** 6月末の薬剤散布（前回より **10 日後**）

|       |                                                                                                                                      |            |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 散布時期  | 6 月 30 日前後                                                                                                                           |            |                       |
| 散布薬剤  | 水                                                                                                                                    | 1 0 0 ℓ 当り |                       |
|       | I C ボルドー412                                                                                                                          | 3. 3 kg    |                       |
|       | ダーズバンD F <b>劇</b>                                                                                                                    | 3 3 g      | （30 日前、3 回） * 注意事項②参照 |
| 対象病害虫 | 輪紋病・シンクイムシ類・ハマキムシ類・クワコナカイガラムシ                                                                                                        |            |                       |
| 散布量   | 10 アール当り：600ℓ                                                                                                                        |            |                       |
| 注意事項  | <p>① IC ボルドーに代えて、オキシラン水和剤の 500 倍（3 日前、9 回）でもよい。</p> <p>② <b>ダーズバンD F は劇物薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。</b></p> <p>③ 葉やけ防止のため涼しい時間帯に散布する。</p> |            |                       |

（参考）無袋 7 月上旬の薬剤散布予定：7/10 前後（前回より 10 日後）