



梅雨明け直後はハダニ類・シンクイムシ類等の最重防除期です。ハダニ類の被害が目立つ場合は、薬剤散布を予定より早める等の対策を講じてください。併せて、薬剤の効果を高めるため、散布前に徒長枝切り等を行い、園全体に薬液が到達するようにしてください。

◆ 和梨の 7 月下旬の定期防除

【有袋】前回から 15 日後

散布時期	7 月 25 日～30 日	◆ 散布日：7 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 リットル 展着剤 2 0 ml ダニゲッターフロアブル 5 0 ml （前日、1 回） キノンドーフロアブル 1 0 0 ml （3 日前、9 回） オリオン水和剤(劇) 1 0 0 g （3 日前、3 回）	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	黒斑病、輪紋病 ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類	
散 布 量	10 アール当たり：450 リットル以上	
注意事項	① オリオン水和剤は劇物登録薬剤です、購入の際は印鑑をお持ちください。	

(参考) 有袋 8 月上中旬の 薬剤散布予定：8/10～15 日頃 (前回より 15 日後)

【無袋】前回から 10～15 日後

散布時期	7 月 25 日～30 日	◆ 散布日：7 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 リットル 展着剤 2 0 ml ダニゲッターフロアブル 5 0 ml （前日、1 回） バイスロイド EW(劇) 5 0 ml （7 日前、2 回） ロブドー水和剤 1 2 5 g （14 日前、5 回）	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	黒斑病 ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類	
散 布 量	10 アール当たり：450 リットル以上	
注意事項	① バイスロイド EW は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ② ロブドー水和剤に代えて、キノンドーフロアブル 1000 倍（3 日前、9 回）でもよい。	

(参考) 無袋 8 月上中旬の 薬剤散布予定：8/10～15 日頃 (前回より 15 日後)

🌻 注意事項共通

- ① 殺ダニ剤の効果を上げるため、今回の薬剤散布の 3～4 日前に下草除草を実施する。
- ② 通常展着剤に代えて、機能性展着剤ササラの 2,000 倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。(殺ダニ剤との相乗効果も期待できる)
- ③ ダニゲッターフロアブルは開花期の水稻に飛散すると不稔等の薬害を生じる場合があるので注意する。

🌻 西洋梨の定期散布は次頁をご覧ください。

◆ 西洋梨の7月下旬の定期防除

【有袋】 前回から 20 日後

散布時期	7 月 25 日～30 日	◆ 散布日：7 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤 1 0 mℓ キノンドーフロアブル 1 0 0 mℓ (3 日前、9 回) ダニゲッターフロアブル 5 0 mℓ (前日、1 回) オリオン水和剤 4 0 劇 1 0 0 g (3 日前、2 回)	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類	
散布量	10 アール当り：600 リットル以上	
注意事項	① オリオン水和剤 40 は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。	

(参考) 8月中旬の 薬剤散布予定：8/15～20日頃（前回より 20 日後）

【無袋】 前回から 10 日後

散布時期	7 月 30 日前後	◆ 散布日 : 7 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤 1 0 mℓ キノンドーフロアブル 1 0 0 mℓ (3 日前、9 回) ダニゲッターフロアブル 5 0 mℓ (前日、1 回) バイスロイド EW (劇) 5 0 ml (7 日前、2 回)	◆ 散布量 : リットル
対象病虫害	輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類	
散布量	10 アール当り : 600 リットル以上	
注意事項	① バイスロイド EW は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。	

(参考) 8月上中旬の 薬剤散布予定：8/15 日前後 (前回より 15 日後)

◆ 注意事項共通

- ① ダニゲッターフロアブルは開花期の水稻に飛散すると、不稔等の薬害を生じる場合があるので注意する。
- ② 殺ダニ剤の効果を上げるため、今回の薬剤散布の3～4日前に下草除草を実施する。
- ③ キノンドーフロアブルに代えてオキシラン水和剤 500 倍（3 日前、9 回）でも良い。有機銅成分を含む薬剤（オキシラン水和剤やキノンドーフロアブル等）の使用回数は合計で 9 回以内であるので注意する。
- ④ 葉やけ防止のため、高温時の散布はしない。

◆ 参考：7月下旬の重点管理作業

- ① 土壌水分管理：定期的なかん水の実施と土壌乾燥防止のため、樹冠下に敷きワラやマルチ等を早めに実施する。
- ② 雑草管理：**バスタ液剤 200 倍**を使用する ⇒ 水 100ℓ 当りバスタ液剤 500ml
- ③ 西洋梨腐らん病対策：梅雨期間に感染拡大しています。病斑を見つけ次第、削り取りを実施してください。