



梅雨明け後の曇天・降雨で腐敗性病害の感染が心配されます。引き続き一定の間隔で薬剤散布を進めてください。7 月末現在、シンクイムシ類が急増中です。盛夏期はハダニ類を含めた主要害虫の発生密度が最も高まります。今回の散布は特に死角で発生しないように注意してください。

◆ **和梨** 8 月の定期防除（他品目への飛散に十分注意してください）

8 月中旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

散布時期	8 月 10 日～15 日	* 幸水等の最終散布	◆ 散布日：8 月 日
散布薬剤	水 展着剤 コロマイト乳剤 キノンドーフロアブル バリアード顆粒水和剤劇	1 0 0 リットル 2 0 ml 1 0 0 ml（前日、1 回） 1 0 0 ml（3 日前、9 回） 5 0 g（前日、3 回）	◆ 散布量： リットル
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、カメムシ類		
散布量	10 アール当たり：450 リットル以上		
注意事項	① 収穫前散布規制のため、早生種の愛甘水等には散布しない。 ② バリアード顆粒水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。		

8 月下旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

散布時期	8 月 25 日～30 日	* 豊水等の最終散布	◆ 散布日：8 月 日
散布薬剤	水 展着剤 キノンドーフロアブル イカズチWDG劇	1 0 0 リットル 2 0 ml 1 0 0 ml（3 日前、9 回） 6 6 g（前日、3 回）	◆ 散布量 リットル
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類		
散布量	10 アール当たり：450 リットル以上		
注意事項	① <u>イカズチWDGは劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。</u> ハダニ類の発生が目立つ場合は、スターマイトフロアブル 2,000 倍（前日、1 回）を加用する。 ② 無袋栽培で、果面の汚れが心配される場合は、キノンドーフロアブルに代えて、ナリアWDG 2000 倍（前日、3 回）でもよい。		

（参考）有袋・無袋 9 月上中旬の薬剤散布予定 9/10～15 日頃（前回より 15 日後）

◆ 共通注意事項

- ① 葉やけ防止のため、高温時の散布はしない。
- ② キノンドーフロアブルを使用する際は、容器の口を下に向けて横に回しながら上下に振り、容器内でよく溶かしてから SS 等のタンクへ投入する。

◆ 西洋梨 8 月の定期防除（他品目への飛散に十分注意してください）

🌻 有袋：8 月中旬の薬剤散布（前回より 20 日後）

散布時期	8 月 15 日～20 日 *オーロラ等の最終防除	◆ 散布日：8 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤 1 0 mℓ キノンドーフロアブル 1 0 0 mℓ (3 日前、9 回) イカズチWDG (劇) 6 6 g (前日、3 回)	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10 アール当り：600 ㍓以上	
注意事項	① キノンドーフロアブルに代えてオキシラン水和剤 500 倍（3 日前、9 回）でもよい ② イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ③ ハダニ類対策：コロマイト乳剤の 1000 倍（前日、1 回）を加用する。	

（参考）有袋次回（9 月上旬）薬剤散布予定：9／5～10 日頃（前回より 20 日後）

🌻 無袋：8 月上中旬の防除（前回から 10 日後）

散布時期	8 月 10 日前後 *オーロラ等の最終防除	◆ 散布日：8 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤 1 0 mℓ キノンドーフロアブル 1 0 0 mℓ (3 日前、9 回) バリアード顆粒水和剤 (劇) 5 0 g (前日、3 回)	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類	
散布量	10 アール当り：600 ㍓以上	
注意事項	① バリアード顆粒水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ② ハダニ類対策：コロマイト乳剤 1000 倍（前日、1 回）を加用する。	

🌻 無袋：8 月下旬の防除（前回から 15 日後）

散布時期	8 月 25 日前後	◆ 散布日：8 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤 1 0 mℓ キノンドーフロアブル 1 0 0 mℓ (3 日前、9 回) イカズチWDG (劇) 6 6 g (前日、3 回)	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10 アール当り：600 ㍓以上	
注意事項	① イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。	

（参考）無袋次回（9 月上旬）薬剤散布予定：9／10 日前後（前回より 15 日後）

◆ 共通注意事項

- ① 葉やけ防止のため、高温時の散布はしない。
- ② キノンドーフロアブルを使用する際は、容器の口を下に向けて横に回しながら上下に振り、容器内でよく溶かしてから SS 等のタンクへ投入する。