

プラム・プルーン特報No.12

平成 29 年 8 月 25 日
J A 中野市営農センター
J A 中野市プラム部会

太陽の収穫が最盛期を経過しています。また、降水量が多く、裂果の発生が心配ですが、選果、選別の際には十分注意して下さい。尚、シンクイムシ類の発生も続いています。防除は最終まで、手を抜かず実施しましょう。

1. 薬剤散布

《プラム》 晩生種 秋姫等 特別散布 (前回から約 10 日後)

・散布時期： 9 月上旬 (9/2~9/6 頃)		・散布日 9 月 日
・散布薬剤： 水	100ℓ 当り	・散布量 ℓ
展着剤 (まくぴか)	20mℓ	
フリントフロアブル25	50mℓ (前日、2回)	
アーデントフロアブル	50mℓ (前日、3回)	
・対象病害虫：灰星病、ハダニ類、(シンクイムシ類)(ケムシ類)		
・散布量：10a 当り SS500ℓ 動噴 600ℓ (散布むらのないよう十分に散布する)		
・注意事項 ① 腐敗果、病虫害果は、園外へ除去しましょう。		
② 収穫中の品種に散布した場合は、丸 1 日収穫を休むこと。		

スモモヒメシンクイムシ発生状況 (前週調査数)	
(各地区フェロモントラップ調査日：8/23) *上今井地区 -33 頭↑ (16)	*倭地区 - 74 頭↑ (60)
(各地区フェロモントラップ調査日：8/21) *深沢 -0 頭 ⇔ (1)	*一本木 -42 頭↓ (73)
*西条 -14 頭⇔ (18)	*草間 -51 頭↓ (248)

《プルーン》 晩生種 特別散布 (前回から約 10 日後)

・散布時期： 9 月上旬 (9/3~9/7 頃)		・散布日 9 月 日
・散布薬剤： 水	100ℓ 当り	・散布量 ℓ
オーシャインフロアブル	33mℓ (前日、3回)	
劇) モスピラン顆粒水溶剤	50g (前日、3回)	
・対象病害虫：灰星病、アブラムシ類、カイガラムシ類幼虫、シンクイムシ類		
・散布量：10a 当り SS500ℓ 動噴 600ℓ (散布むらのないよう十分に散布する。)		
・注意事項 ① 腐敗果、病虫害果は、園外へ除去しましょう。		
② 収穫中の品種に散布した場合は、丸 1 日収穫を休むこと。		

2. 収穫終了後、各品種の防除 (受粉樹へも散布する)

隣接園 (特に収穫期の作物) に飛散しないように注意して下さい

・散布時期： 8 月下旬~		・散布日 8・9 月 日
・散布薬剤： 水	100ℓ 当り	・散布量 ℓ
展着剤		
ICボルドー412	3. 3kg	
ダースバンDF	33g (14 日前、2回)	
・対象病害虫：黒斑病 (かいよう病)、シンクイムシ類、ウメシロカイガラムシ		
・散布量：10a 当り SS400ℓ 動噴 500ℓ (各主枝、徒長枝等に十分かかるように散布する。)		
・注意事項：①汚れが出やすいので、周辺の作物へ飛散しないようにする。		
②展着剤はアピオン-E1000 倍かK.Kステッカー-3000 倍を使用する。k k ステッカーを使用する場合必ず最後に調合する。		

3. 礼肥の施肥 (収穫終了後) . . . 天然ボカシ肥 5袋 (10a 当り)