

# もも・ネクタリン特報

H29. 8.25 No.11  
J A 中野市営農センター  
J A 中野市りんご・もも部会

降雨・曇天が続き、果肉先行・収穫ロスが多発しております。収穫が遅れないよう注意してください。また、灰星病などの腐敗性病害対策を徹底してください。（殺菌剤散布、腐敗果実の除去）

\*成熟は昨年よりも8～10日程度遅れていますが、除袋などの管理作業は早めに進めてください。

\*除袋間近な場合は、除袋後に散布を実施してください。

\*毒物・劇物を購入の際は、印鑑をご持参ください。

## もも

散布時期：前回散布から14日後（8月31日～9月6日頃）

散布薬剤： 水	100ℓ
展着剤	20ml
ベルコートフロアブル	50ml（前日、3回）

散布日	月	日
散布量		ℓ

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモブシス腐敗病

10a 当り散布量：600ℓ

### 【注意事項】

- ① シンクイムシ類などの害虫発生が心配される場合は、アーデントフロアブルの2,000倍(前日、3回)を加用散布する。

## ネクタリン

散布時期：前回散布から14日後（8月31日～9月6日頃）

散布薬剤： 水	100ℓ
展着剤	20ml
ベルコートフロアブル	50ml（前日、2回）

散布日	月	日
散布量		ℓ

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモブシス腐敗病

10a 当り散布量：600ℓ

### 【注意事項】

- ① シンクイムシ類などの害虫発生が心配される場合は、アーデントフロアブルの2,000倍(前日、3回)を加用散布する。

果実腐敗病対策・・・ 今回の散布以降の腐敗性病害対策として、もも・ネクタリン特報No.9を参照し、系統の異なる殺菌剤をローテーション散布してください。