

| 散布日                                                           | 散布時期                      | 散布薬剤（水１００ℓ当り）                                                                                           | 収穫前<br>使用時期              | 使用<br>回数<br>(以内)     | 散布量<br>(ℓ) | 対象病害虫<br>(発生病害虫)                                                        | 注 意 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月<br>日                                                        | 3月<br>下旬<br>(発芽前)         | (水98ℓ)<br>①スプレーオイル<br>トレノックスフロアブル<br>2ℓ<br>200mℓ                                                        | 発芽前<br>7日前               | —<br>5回              | 300        | 縮葉病<br>カイガラムシ類<br>ハダニ類                                                  | ①コスカシバの発生園は被害部の樹脂を取り除きガットサイドS1.5倍液（30日前、1回）を樹幹部に塗布する。<br>②せん孔細菌病多発園は、開花前にキンセツ水和剤80の1000倍（収穫後～開花直前まで＊ただし収穫60日前まで、5回）を特別散布する。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 必須作業（4～6月） ＊せん孔細菌病の伝染源となる春型枝病斑をこまめに切除し、園外で処分する。               |                           |                                                                                                         |                          |                      |            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 月<br>日                                                        | 開花<br>始め<br>(1～2輪咲)       | ②アビオンE(固着性展着剤)<br>ICボルドー412<br>100mℓ<br>3.3kg                                                           | —<br>—                   | —<br>—               | 350        | せん孔細菌病                                                                  | ①ボルドー液は展葉後の散布は薬害が著しいので散布時期を厳守する。<br>②ICボルドー412に代えて4-12式ボルドー液でもよい。<br>③せん孔細菌病が多発する園地は、5月上旬以降、通常展着剤に代えて固着性展着剤アビオンE等を使用する。アビオンEに代えてKKステッカーの3000倍を使用してもよい。(KKステッカー必ず最後に調合する)<br>④アブラムシ類の発生園はウララDF2000倍（14日前、2回）を加用する。<br>⑤黒星病（うどんこ病）の発生が心配される場合は、5月上旬にコロナフロアブル500倍を加用する。<br>⑥ストマイ液剤20・アグレプト水和剤、アグリマイシン-100、等の使用回数は、合計で2回までとする。尚、ぶどうにかかると種無し果を生じるので、隣接園に飛散しないよう注意する。<br>⑦アグリマイシン-100に代えて、ストマイ液剤20・アグレプト水和剤の1000倍（60日前、2回）でもよい。 |
| 月<br>日                                                        | 5月上旬<br>落花後<br>(前回から10日後) | ③展着剤<br>トレノックスフロアブル<br>サムコフロアブル10<br>ストマイ液剤20<br>10mℓ<br>200mℓ<br>20mℓ<br>100mℓ                         | 7日前<br>前日<br>60日前        | 5回<br>2回<br>2回       | 350        | せん孔細菌病<br>黒星病、灰星病<br>モモハモグリガ<br>ハマキムシ類                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 月<br>日                                                        | 5月<br>中旬<br>(前回から10日後)    | ④展着剤<br>アプロードフロアブル<br>ストロビードライフフロアブル<br>モスピラン顆粒水溶剤<br>アグリマイシン-100<br>10mℓ<br>100mℓ<br>50g<br>25g<br>66g | 14日前<br>前日<br>前日<br>60日前 | 3回<br>3回<br>3回<br>2回 | 400        | せん孔細菌病<br>黒星病・灰星病<br>うどんこ病<br>アブラムシ類<br>モモハモグリガ<br>シンクイムシ類<br>カイガラムシ類幼虫 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 月<br>日                                                        | 5月<br>下旬<br>(前回から10日後)    | ⑤展着剤<br>フルーツセイバー<br>コルト顆粒水和剤<br>マイコシールド<br>10mℓ<br>50mℓ<br>50g<br>66g                                   | 前日<br>前日<br>21日前         | 3回<br>3回<br>5回       | 500        | せん孔細菌病<br>黒星病・灰星病<br>（うどんこ病）<br>アブラムシ類<br>カイガラムシ類                       | ①フルーツセイバーに代えて、トレノックスフロアブルの500倍（7日前、5回）でもよい。<br>②コルト顆粒水和剤に代えて、ハチハチフロアブルの2000倍（前日、2回）でもよい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 月<br>日                                                        | 6月<br>月上旬<br>(前回から10日後)   | ⑥展着剤<br>デランフロアブル<br>アルバリン顆粒水溶剤<br>マイコシールド<br>20mℓ<br>100mℓ<br>50g<br>66g                                | 7日前<br>前日<br>21日前        | 4回<br>3回<br>5回       | 500        | せん孔細菌病<br>黒星病、（灰星病）<br>（ホモブシス腐敗病）<br>モモハモグリガ<br>アブラムシ類<br>シンクイムシ類       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 月<br>日                                                        | 6月<br>中旬<br>(前回から7～10日後)  | ⑦展着剤<br>マイコシールド<br>20mℓ<br>66g                                                                          | 21日前                     | 5回                   | 600        | せん孔細菌病                                                                  | ①カメムシ類の発生園はスミチオン水和剤40の1000倍（3日前、6回）を加用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 月<br>日                                                        | 6月<br>下旬<br>(前回から10日後)    | ⑧展着剤<br>デランフロアブル<br>ダーズバンDF<br>マイコシールド<br>20mℓ<br>100mℓ<br>33g<br>66g                                   | 7日前<br>14日前<br>21日前      | 4回<br>5回<br>5回       | 600        | せん孔細菌病<br>黒星病、（灰星病）<br>（ホモブシス腐敗病）<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>ウメシロカイガラムシ    | ★袋掛けは、6月末までに終了する。（黄金桃など、生理落果が心配される場合は7月上中旬を目安とする）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 月<br>日                                                        | 7月<br>月上旬<br>(前回から15日後)   | ⑨展着剤<br>ダニゲッターフロアブル<br>ナリアWDG<br>イカズチWDG<br>20mℓ<br>50mℓ<br>50g<br>66g                                  | 前日<br>前日<br>前日           | 1回<br>2回<br>5回       | 600        | 灰星病、黒星病<br>ホモブシス腐敗病<br>シンクイムシ類<br>モモハモグリガ<br>カメムシ類<br>ハダニ類              | ①せん孔細菌病の発生が心配される場合（袋掛けが終了していない場合）は、スターナ水和剤の1000倍（7日前、3回）を加用する。<br>②ナリアWDGはぶどう（ピオーネ、サニールージュ）、西洋梨ル・レクチェに薬害を生じる恐れがあるので、隣接園は注意する。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 月<br>日                                                        | 7月<br>中下旬                 | ⑩展着剤<br>オンリーワンフロアブル<br>ディアナWDG<br>20mℓ<br>50mℓ<br>10g                                                   | 前日<br>前日                 | 3回<br>2回             | 600        | 灰星病、黒星病<br>ホモブシス腐敗病<br>シンクイムシ類<br>モモハモグリガ<br>（アザミウマ類）                   | ①せん孔細菌病の発生が心配される場合（袋掛けが終了していない場合）は、スターナ水和剤の1000倍（7日前、3回）を加用する。<br>②シンクイムシ類の発生が心配される場合は、ディアナWDGに代えてモスピラン顆粒水溶剤の4000倍（前日、3回）を使用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 月<br>日                                                        | 8月<br>月上旬                 | ⑪展着剤<br>ベルコートフロアブル<br>アーデントフロアブル<br>20mℓ<br>50mℓ<br>50mℓ                                                | 前日<br>前日                 | 3回<br>3回             | 600        | 灰星病、黒星病<br>ホモブシス腐敗病<br>シンクイムシ類<br>カメムシ類<br>（アザミウマ類）<br>（モモハモグリガ）        | ★有袋品種は除袋後に散布する。<br>①ハダニ類の発生園はコロマイト乳剤の1000倍（7日前、1回）を加用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 月<br>日                                                        | 8月<br>中下旬                 | ⑫展着剤<br>オーシャインフロアブル<br>サムコフロアブル10<br>20mℓ<br>50mℓ<br>20mℓ                                               | 前日<br>前日                 | 3回<br>2回             | 600        | 灰星病、黒星病<br>ホモブシス腐敗病<br>モモハモグリガ<br>シンクイムシ類                               | ★有袋品種は除袋後に散布する。<br>①シンクイムシ類、（ミカンキイロアザミウマ）の発生が心配される場合は、サムコフロアブルに代えて、エクシレルSEの5000倍（前日、3回）を使用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 月<br>日                                                        | 9月<br>月上旬                 | ⑬展着剤<br>ベルコートフロアブル<br>20mℓ<br>50mℓ                                                                      | 前日                       | 3回                   | 600        | 灰星病、黒星病<br>ホモブシス腐敗病                                                     | ★有袋品種は除袋後に散布する。<br>①シンクイムシ類、（アザミウマ類）の発生が心配される場合は、アーデントフロアブル2000倍（前日、3回）を加用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 月<br>日                                                        | 9月<br>上中旬                 | ⑭アビオンE<br>ICボルドー412<br>100mℓ<br>3.3kg                                                                   | —                        | —                    | 600        | せん孔細菌病                                                                  | ①ICボルドー412に代えて4-12式ボルドー液、コサイド3000の2000倍（収穫後～落葉まで）を使用してもよい。（コサイド3000を散布する際、薬害が心配される場合はクレフノン100倍を加用する）<br><br>【落葉後～萌芽前までの防除】<br>コスカシバの発生園は、ラビキラー乳剤200倍（休眠期、1回）を樹幹及び主枝に十分散布する。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 月<br>日                                                        | 9月<br>中下旬                 | ⑮アビオンE<br>ICボルドー412<br>100mℓ<br>3.3kg                                                                   | —                        | —                    |            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 月<br>日                                                        | 10月<br>月上旬                | ⑯アビオンE<br>ICボルドー412<br>100mℓ<br>3.3kg                                                                   | —                        | —                    |            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 特別散布 休眠期 縮葉病が発生した園地は、落葉後にオキシラン水和剤の500倍（発芽前～開花直前まで、4回）を特別散布する。 |                           |                                                                                                         |                          |                      |            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |