

ぶどう特報（晩腐・黒とう病対策特別号）

No.2 H30.4.13
JA 中野市営農センター
JA中野市ぶどう部会

生育は 1 週間程度進んでいる見込みです。休眠期防除は昨年多発した晩腐・黒とう病の重要防除時期になります。適期散布と散布死角のないように実施して下さい。

発芽予想日	昨 年	南 部	北 部
巨 峰	4 月 28 日	4 月 20 日頃？	4 月 23 日頃？
シャインマスカット	5 月 1 日頃	4 月 25 日頃？	4 月 28 日頃？

第 1 回ぶどう定期散布

1. 晩腐病対策防除（シャインマスカット園以外実施）

散布時期	発芽直前（4 月中旬頃）	南部：4/15～ 北部：4/18～		
散布品種	巨峰・ピオーネ・パープル 他（シャインマスカット以外すべて）			
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日
	アビオンーE（展着剤）	100	ml	
	ベンレート水和剤 （休眠期・1 回）	500	g	
散布量	300ℓ／10a （手散布）			
適用病害虫	晩腐病・黒とう病・つる割病・枝膨病			
注意点	①りんご・もも等に薬剤がかかると薬害・落花が発生するので注意する。 ②隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へ連絡して下さい。			

2. 黒とう病対策防除（シャインマスカット園実施）

散布時期	発芽直前（4 月下旬頃）	南部：4/20～		北部：4/23～	
散布品種	シャインマスカット、シャインマスカット混植園				
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日	
	アビオンーE（展着剤）	100	ml		
	デランフロアブル（劇物）（休眠期・1 回）	500	ml		
散布量	300ℓ／10a（手散布）				
適用病害虫	晩腐病・黒とう病・つる割病				
注意点	※混用前はよく振ってから混用する。（底に有効成分が沈殿しているので必ず振る） ①発芽後の散布は薬害が発生するため、必ず発芽前の散布をする。 ②巨峰等との混植園の場合は、 <u>巨峰の発芽生育に合わせて散布をする。</u>				

※注意※ ベンレート・デランフロアブルの散布タイミングについて

両剤の散布タイミングは以下の写真の時期になります。生育状況を確認して散布をお願いします。



← 発芽直前

芽が膨らみ、リン毛に覆われている状態

発芽後は散布しない

デランの薬害は展葉後生育初期まで縮葉が発生し、生産量品質低下が発生します