



ぶとう特報

No. 1 H30. 3. 30
J A 中野市営農センター
J A 中野市ぶどう部会

芽キズ処理、発芽促進剤（C X-10）未処理の畑は至急実施する。粗皮削り、藁はずしは一回目の防除前に行って下さい。（4 月の月上旬頃）。ぶどう苗木植え付けは地温が 13℃以上になってから植え付ける（4 月上中旬頃）

H30 生育予想	発芽	展葉	開花
平年	4/28	5/1	6/7
昨年	4/28	5/2	6/9
本年	4/23?	4/26?	6/2?

休眠期特別散布

散布時期	4 月上旬[特別散布]（ブドウトラカミキリ発生園...枝の髓が食害されているもの）		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日 月 日
	展着剤（ハイテンパワー）	20 ml	
	ラビキラー乳剤（劇物）（休眠期・2 回以内）	500 ml	
散布量	300ℓ／10a		
適用病害虫	ブドウトラカミキリ		
注意点	昨年晩腐病が多発した園はパスポートフロアブル 250 倍（休眠期・1 回）を加用散布しても良い。（第 1 回のベンレートも休眠期防除として散布する） ・ラビキラー乳剤は訪花昆虫に影響があるので 4 月上旬に散布。（訪花昆虫が活動する前の早朝に散布をする） ・粗皮はぎ後、発芽前に散布する。 ・ベンレート水和剤（200 倍、休眠期、1 回）との混用も可能（石灰硫黄合剤とは混用不可）		

◎石灰硫黄合剤の使用について◎

ハダニ発生園は、石灰硫黄合剤 20 倍(100l に 5l)の散布で発生密度を下げるすることができます。

薬剤名	使用倍率	対象病害	合剤と混用
ベフラン液剤 25	250 倍	晩腐病○ 黒とう○	○
ベンレート水和剤	200 倍	晩腐病◎ 黒とう○	○
デランフロアブル	200 倍	晩腐病○ 黒とう◎	×
パスポートフロアブル	250 倍	晩腐病○ 黒とう○	×

※晩腐・黒とう病特別対策講習会開催について※

以下の日程で、上記講習会を実施します。皆様万障お繰り合わせの上ご参加下さい。

地区	日時	場所
中野	4 月 11 日（水）午前 11 時～	中野事業所
日野	4 月 11 日（水）午前 9 時～	日野事業所
延徳	4 月 12 日（木）午前 9 時～	延徳事業所
平野	4 月 13 日（金）午前 9 時～	平野事業所
高丘	4 月 11 日（水）午後 2 時～	高丘事業所
長丘	4 月 12 日（木）午前 11 時～	長丘事業所
平岡①	4 月 13 日（金）午後 2 時～	平岡事業所
平岡②	4 月 7 日（土）午後 2 時～	平岡事業所
科野	4 月 12 日（木）午後 2 時～	科野事業所
倭	4 月 13 日（金）午前 11 時～	倭事業所

内容

1. 防除時期について（散布タイミングの確認）
2. 防除方法について（やり方の確認）
3. 晩腐・黒とう病の症状について（病斑などの確認）
4. その他

ご不明な点があれば、ぶどう担当までご連絡ください

次頁あり

◎H30度 ぶどう防除暦採用農薬登録一覧表 (一印は規制なし ×印は登録なし)

農薬名	りんご	もも	なし	プラム	おうとう サクランボ	アスパラガス	きゅうり
ラビキラー乳剤	30 日前	休眠期	×	×	休眠期	×	×
ベンレート水和剤	前日	前日	前日		3 日前	前日	前日
デランフロアブル	60 日前	7 日前	60 日前	×	収穫終了～ 落葉期	×	×
オンリーワンF	7 日前	前日	前日	前日	前日	×	×
モスピラン顆粒水溶剤	前日	前日	前日	前日	前日	前日	前日
ダイザノ水和剤 34	30 日前	前日	14 日前	21 日前	14 日前	×	×
オーソサイド水和剤	14 日前	発芽前	3 日前	21 日前	14 日前	×	前日
ドーシャスF	×	前日	×	×	×	×	前日
ストマイ液剤	×	60 日前	×	×	×	×	×
フラスター液剤	×	×	×	×	×	×	×
フルーツセイバー	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
オルトラン水和剤	×	×	×	×	×	×	×
コテツフロアブル	前日	前日	前日	前日	14 日前	前日	前日
スイッチ顆粒水和剤	×	×	×	×	×	×	×
ジマダ他ノ水和剤	30 日前	21 日前	30 日前	×	21 日前	収穫終了後 秋期まで	前日
フェニックスフロアブル	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
アドマイヤ-顆粒水和剤	3 日前	3 日前	3 日前	21 日前	×	前日	前日
ペンコゼブF	×	×	×	×	×	×	前日
ザンプロDMF	×	×	×	×	×	×	前日
アミスター10F	45 日前	前日	前日	前日	前日	×	×
ディアナWDG	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
ライメイフロアブル	×	×	×	×	×	×	前日
アーデントF	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
ムッシュボルト-D F	×	開花前まで	×	葉芽発芽前 まで	収穫後	—	—
アルバリン顆粒水溶剤	前日	前日	前日	前日	前日	前日	前日
スターマイトF	前日	前日	前日	前日	前日	×	前日
ICボルドー66D	×	—	×	×	—	収穫終了後	×
テルスター水和剤	前日	14 日前	前日	×	×	×	前日

※平成 30 年 3 月現在の状況です。

※農薬使用の際はラベルをよく読み、登録内容を確認してから使用・散布するようにして下さい。

毎年、薬剤飛散（ドリフト）による事故が発生しています。
畑に隣接している農作物には絶対飛散しない様に SS 操作の確認をし、防除ネット等を設置し十分注意して下さい。

不明な点はお近くの事業所、または営農センターまでお問い合わせ下さい。
薬剤散布をしたら栽培日誌に記入しましょう。（4 月配布予定）