

ぶどう特報No.3



No.3 H30.4.20
JA 中野市営農センター
JA中野市ぶどう部会

今回の防除は散布時期が重要になります。週間天気予報や生育状況を確認して、散布遅れがないように薬剤散布を実施して下さい。生育状況は平年比 5～7 日程度早い状況です。

発芽予想日	昨 年	南 部	北 部
巨 峰	4 月 28 日	4 月 20 日頃？	4 月 22 日頃？
シャインマスカット	5 月 1 日頃	4 月 25 日頃？	4 月 28 日頃？

第 2 回 シャインマスカット定期防除(カスミカメムシ対策防除(葉に穴をあける虫))

散布時期	発芽直後（4 月末頃）	南部：4/25～	北部：4/28～
散布品種	シャインマスカット、ロザリオビアンコ、単植・混植園		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日
	展着剤（ハイテンパワー）	10 ml	月 日
	モスピラン顆粒水溶剤（劇物）（14 日前・3 回）	50 g	
散布量	300ℓ／10a		
適用病害虫	ツマグロアオカスミカメ・カイガラムシ類・アザミウマ類		
注意点	①シャインマスカット、ロザリオビアンコ園は必ず散布する。（混植園も散布） ②訪花昆虫保護のため、畦畔の草刈りを実施し 早朝に防除する。（散布時期に注意） ③園地の 3 割程度が発芽したら散布を実施する。 モスピランの散布時期（園内 3 割が右の写真の頃）⇒		



第 3 回 シャインマスカット定期防除（黒とう病対策防除）

散布時期	展葉 2～3 枚（5 月上中旬頃）	南部：5/1 頃～	北部：5/4 頃～
散布品種	シャインマスカット、シャインマスカット混植園		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日
	展着剤（ハイテンパワー）	10 ml	月 日
	オンリーワンフロアブル（前日・3 回）	50 ml	
散布量	300ℓ／10a		
適用病害虫	黒とう病・うどんこ病・灰色かび病・晩腐病		
注意点	※黒とう病重要防除。散布忘れ・遅れのないよう実施する。 ①ツマグロアオカスミカメ・クワコナカイガラムシ の発生園はダイアジノン水和剤 34 1,000 倍 （30 日前、2 回）を加用散布する。 オンリーワン散布時期（園内 3 割が右の写真の頃）⇒		

