

ぶどう情報 (26.5.20)

J A中野市営農センター

1. 気象・生育経過

ぶどう	発芽	展葉	開花
本年	4/28	5/2	6/10?
昨年	4/29	5/2	6/11
平年	4/28	5/2	6/10

ぶどうの生育は現状展葉 5・6 枚、**昨年平年並みの開花か?** (果樹試 6/9 開花予想)
5 月は降水量 13mm 平年比 28%、土壌水分不足により生育のバラつきあり
4 月も土壌乾燥等により苗木・若木の生育不良発生

2. ジベレリン早期処理について

ジベレリンは種なし化・果粒肥大の他に花穂伸長効果があります
摘粒が間に合わない園、摘粒に時間を要する品種等で処理して下さい

品種	処理時期	処理濃度	処理方法
巨峰系 4 倍体品種	展葉 3~5 枚	ジベレリン 3~5ppm	花房散布
サニールージュ	1 回目(展葉 9 枚頃) 満開 14~20 日前	ジベレリン 25ppm (+フルメット 3ppm)	花房浸漬
	2 回目 満開 10~14 日後	ジベレリン 25ppm のみ	
シャインマスカット (2 倍体欧州系品種)	展葉 6~8 枚	フルメット 1~2ppm	花房散布

サニールージュは

早期処理することにより、摘粒作業の効率化・作業性が改善、良品生産されます

3. ジベレリン早期処理講習会・短梢仕立て新梢管理講習会開催について

場所	日時	集合場所・園地場所	
平野	5 月 27 日(火)8:30	岩船 町田弘治さん園	中野西高北側岩船集落沿い 三角屋根ハウス周辺
平岡	5 月 28 日(水)8:30	平岡試験圃場	平岡事業所裏
科野	5 月 28 日(水)8:30	科野事業所集合	現地移動

内容 ジベレリン処理方法確認
短梢仕立て新梢管理方法の確認
今後の管理

4. ハウス技術情報

ジベレリン・フルメット濃度

	種なし巨峰 シャイン	パープル	ピオーネ	
1 回目	G25+F5	G25 のみ	G12.5+F5	G25ppm 水 2 畝に 2 粒
2 回目	G25 のみ			フルメット 5ppm 水 2 畝に 1 本

粒肥大が良すぎる園はフルメットの濃度を調節する

摘粒方法

品種により長い園が目立ちます
お盆までは各品種 5 kg 裸詰め出荷が主体となります

- ・種なし巨峰・・・房重 350~400g 目標では粒数 23~25 粒段数 12 段
 - ・シャイン・・・房重 500~600g 目標では粒数 33~40 粒段数 12・13 段
- 現地指導します。不安な方はぶどう担当まで連絡下さい。園技小林