

ぶどう特報No.5



No.5 H30.4.27
JA 中野市営農センター
JA中野市ぶどう部会

今回の防除からは10日間隔の防除になります。

防除は予防を意識し、降雨が予想される日より前の散布を心がけましょう。

※裏面にぶどう特報No.4あります。

第4回（第2回）ぶどう定期防除【今回から10日間隔で防除】

散布時期	展葉6枚頃（5月上旬）	南部：5/5～	北部：5/8～（巨峰）	
散布品種	全品種			
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日
	展着剤（ハイテンパワー）	10	ml	
	オーソサイド水和剤 80	（45日前・2回）	125	
	※マルポロン（有核）	花振り防止	100	g
※グリーンデイズ	微量要素補給等	100	g	
または ビッグマグ（種なし）	葉色向上	100	g	
散布量	300ℓ/10a			
適用病害虫	晩腐病・ベと病・灰色かび病・黒とう病			
注意点	① カイガラムシ・（カスミカメムシ）・（クロヒメゾウムシ）発生園は（劇物）スプラサイド水和剤 1,500 倍（14 日前、2 回）を加用する。 ② オーソサイド水和剤に代えてアリエティC水和剤 800 倍（45 日前、2 回）を使用しても良い。但し、オーソサイドとアリエティCの一成分は同じため、使用回数に注意する。（両剤合わせて2回まで）			

第5回（第3回）ぶどう定期防除【前回から10日後】

散布時期	展葉9枚頃（5月中旬頃）	南部：5/14頃～	北部：5/17頃～（巨峰）	
散布品種	全品種			
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日
	展着剤（ハイテンパワー）	10	ml	
	ドーシャスフロアブル	（60日前・3回）	50	
	※マルポロン（有核）	花振り防止	100	g
※グリーンデイズ	微量要素補給等	100	g	
または ビッグマグ（種なし）	葉色向上	100	g	
散布量	300ℓ/10a			
適用病害虫	晩腐病・黒とう病・ベと病			
注意点	① アブラムシ等の害虫発生がある場合はアディオン水和剤 2,000 倍（7 日前、5 回）を加用する。 ② 日中の高温時の散布は避け、気温が低く、風のない時に散布をする。 ③ 葉の表裏にしっかりかかるよう散布する。			

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。