

ぶどう特報No.6



No.6 H30.5.11
JA 中野市営農センター
JA中野市ぶどう部会

生育は、平年と比較して1週間程度早い状況。(平成28年度並み)

ストマイ液剤は「種なしぶどう」にする重要な薬剤のため、散布忘れや散布遅れのないよう注意して下さい。

H30	発芽	展葉	開花	満開	落花
平年(巨峰)	4月28日	5月1日	6月7日	6月11日	6月14日
昨年(巨峰)	4月28日	5月2日	6月9日	6月17日	6月20日
本年(巨峰)	4月22日	4月25日	5月28日?	6月2日?	6月6日?
本年(シャイン)	4月27日	5月1日	6月5日頃?	6月8日頃?	6月11日頃?

第6回【種なしぶどう必須散布】(ぶどうの種なし化)

散布時期	5月中旬(満開の14日前~開花始期)	南部:5/14~ 北部:5/17~(巨峰)
散布品種	種なしぶどう全品種	
散布薬剤	水 100 ℓ 展着剤(ハイテンパワー) 10 ml ストマイ液剤 20 (満開予定日の14日前~開花始期) 100 ml	散布日 月 日
散布量	300ℓ/10a	
注意点	※種なしぶどうは必ず散布する(有核巨峰には絶対にかからないよう注意する) @満開14日前は概ね展葉9枚頃になるので、生育状況を確認して散布する。 ① 花穂に当るように、散布前に誘引を実施する。 ② 種なし巨峰とシャインマスカットの混植園は開花時期が違うのでストマイの散布時期に注意する。(混植園は巨峰展葉11枚頃に合わせて散布をする(目安)) ③ ストマイ液剤は散布が開花期に近いほど効果が低くなるので散布遅れに注意。	

フラスター散布【全品種】(着粒安定・新梢伸長抑制)

散布時期	展葉7枚~11枚頃 (5月中旬~下旬頃)	有核:南部:5/14頃~ 北部:5/17頃~ 種なし:南部:5/20頃~ 北部:5/23頃~
散布品種	全品種	
散布薬剤	水 100 ℓ 展着剤(ハイテンパワー) 10 ml フラスター液剤 下記参照 50~200 ml	散布日 月 日
散布薬剤	・有核巨峰 125~200 ml ・種なし巨峰 100 ml (1,000倍) ・シャインマスカット 50 ml (2,000倍) ・カハール・ピオーネ (巨峰系4倍体と3倍体品種) 125~200ml	
散布量	100~150ℓ/10a (手散布)	300ℓ/10a (露地巨峰)SS散布
注意点	※品種、散布方法により使用倍率、散布時期が違います。(登録厳守) ※有核巨峰は【ハイパワー】に代えて【アプローチB】500倍を使用する ① 農薬とは混用しない。 ② 日中の高温時は避けて散布する。	

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。