

黒とう病が園地で確認されています。降雨が多いため、散布忘れ・遅れのないよう適期に散布を実施して下さい。

H30	開花	満開	落花
平 年（巨峰）	6月7日	6月11日	6月14日
昨 年（巨峰）	6月9日	6月17日	6月20日
本 年（巨峰）	5月30日？	6月3日？	6月 6日？
本年（シャイン）	6月8日？	6月11日頃？	6月14日頃？

第8回（第5回）【ぶどう定期防除】（晩腐病、黒とう病、スリップス類防除）

散布時期	前回から１０日（落花直後）		南部：6/6～ 北部：6/9～（巨峰）	
散布品種	全品種			
散布薬剤	水		100 ℓ	散布日 月 日
	（劇物）コテツフロアブル	（60 日前、2 回）	50 ml	
	スイッチ顆粒水和剤	（30 日前、2 回）	33 g	
	ジマンダイセン水和剤	（45 日前、2 回）	100 g	
散布量	400ℓ／10a			
注意点	① 昨年ベと病多発生園はゾーバックエニケード 5,000 倍（14 日前、2 回）を加用散布する。 ② ジマンダイセン・ペンコゼブ・リドミルゴールドMZの一成分は同一成分のため使用回数に注意する（合計 2 回まで） ③ 例年クビアカスカシバが発生する園は（劇物）パダンSG水溶剤 1,500 倍（収穫21日前、5回）を主幹部にしっかりかかるように加用散布する。（果粉溶脱の心配があるため小豆大頃までの散布とする。）			

☆房切りについて☆

房切りの時期が近くなってきております。このまま順調に生育が進めば早いところで5月末あたりから房切りが実施可能です。房切りにつきましては下記の表を参考に実施して下さい。

品 種	房切り目安	目標粒数	目標房重
種なし巨峰	満開時 3.0 cm	30 粒程度	400 g
有核巨峰	満開時 7.0 cm	35 粒程度	350 g
シャインマスカット（5k）	満開時 3.5 cm	35 粒程度	550 g
シャインマスカット（PC）	満開時 2.5 cm	25 粒程度	350 g
ピオーネ	満開時 2.5 cm	25 粒程度	400 g
ナガノパープル	満開時 3.0 cm	30 粒程度	400 g
クイーンニーナ	満開時 3.0 cm	30 粒程度	500 g
ロザリオビアンコ	満開時 7.0 cm	35 粒程度	400 g
サニールージュ	満開時 6.0 cm	40 粒程度	300 g

※重要※ 黒とう病の発生！！

現地での発生が確認されています（若木） 梅雨期以降は症状の拡大が予想されるので、梅雨前に以下の点を確認して下さい。

- ① 症状の確認 ⇒ 右写真参照
- ② 防除の実施 ⇒ 未防除園で発生が確認
- ③ 草刈りの実施 ⇒ 下草からの伝染があります
- ④ 昨年発生した場所の確認 ⇒ 昨年の病斑が伝染源
- ⑤ 被害枝葉の確認 ⇒ 被害枝葉を園地外へ持ち出す
- ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。

