

ぶどう特報No.9



No.9 H30.6.8
JA 中野市営農センター
JA中野市ぶどう部会

- ・生育は平年と比べ1週間程度早い状況。梅雨入りが予想されます。降雨前の散布に努めて下さい。
- ・シャインマスカットで未開花症状や、黒とう病が一部園地で発生しております。症状を確認して下さい。
- ・有核巨峰は開花中に降雨や曇天がありましたので親子の恐れがあります。結実を確認して下さい。

H30	開花	満開	落花
種なし巨峰（平岡）	6月2日	6月5日	6月7日？
シャイン（平岡）	6月9日？	6月12日？	6月15日？

第9回（第6回）【ぶどう定期防除】（黒とう病、晩腐病、スリップス類・クビアカスカシバ防除）

散布時期	前回から10日（落花 10 日後）	南部：6/16～ 北部：6/19～（巨峰）			
散布品種	全品種				
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日	
	フェニックスフロアブル	（14 日前、2 回）	25		ml
	（劇物）アドマイヤー顆粒水和剤	（21 日前、2 回）	10		g
	※1 ジマンダイセン水和剤	（45 日前、2 回）	100		g
シャイン パープル等	※1 ジマンダイセンに代えて ペンコゼブフロアブル			（60 日前、2 回）	100 ml
散布量	400ℓ／10a				
注意点	※雨よけ栽培はペンコゼブフロアブルの登録がないため、代わりにホライズンドライフロアブル 2,500 倍（21 日前、3 回）を散布する。 ※皮ごと食べるぶどうはジマンダイセン水和剤に代えてペンコゼブフロアブルを散布する。 ① 落花 10 日の防除は散布が遅いと薬液の汚れが果面に残るので注意する。 ② ジマンダイセン・ペンコゼブ・リドミルゴールドMZの同一成分のため使用回数に注意する（合計 2 回まで） ③ カメムシ・コガネムシ発生園はアドマイヤーに代えてアーデントフロアブル 2,000 倍（前日、4 回）を散布してもよい。				

第10回（第7回）【ぶどう定期防除】（晩腐病、黒とう病、スリップス類・ダニ類防除）

散布時期	前回から１０日（落花 20 日後）	南部：6/26～ 北部：6/29～（巨峰）			
散布品種	全品種				
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日	
	ザンプロDMフロアブル	（30 日前、2 回）	50		ml
	アミスター10フロアブル	（30 日前、3 回）	100		ml
	ディアナWDG	（前日、2 回）	10		g
散布量	400ℓ／10a				
注意点	※この防除終了後できるだけ早めの袋かけに努める。（遅くなると病害の発生が心配）※ ① 外 肋 肋 等 の 主 幹 害 虫 発 生 園 は、サ ム コ ル フ ロ ア ブ ル 10 5,000 倍（収穫前日まで、3回）を主幹、主枝へもたっぷり加用散布する。また、食害部にいる幼虫は捕殺に努める。 ② 散布の際は、果粉溶脱に注意し散布する。 ③ 農薬散布の際は、隣接する園に注意し農薬飛散（ドリフト）のないよう十分注意する。				

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。