



● 和梨の定期防除 (収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。)

【有袋】6月下旬の薬剤散布 (前回より 15 日後)

散布時期	6月20日～25日		◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水	100ℓ	◆ 散布量 ℓ
	展着剤	20ml	
	ベルコートフロアブル	50ml (14日前、5回)	
	スプラサイド水和剤 ^劇	66g (7日前、3回) *注意事項③参照	
対象病害虫	黒斑病、黒星病、シンクイムシ類、カイガラムシ類、カメムシ類		
散布量	10a 当り：450ℓ以上		
注意事項	① 黒斑病対策：ロブドー水和剤 800 倍(14 日前、5 回)を加用する。 ② ハダニ類対策：カネマイトフロアブル 1,000 倍 (前日、1 回) を加用する。 ③ スプラサイド水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。 ④ 通常展着剤 (ハイテンパワー等) に代えて、固着性展着剤のアビオン E の 1,000 倍 (100ℓ当り 100ml) を使用すると、薬液付着効果が高まる		
(参考) 有袋 7 月上旬の薬剤散布予定 : 7/5～10			

【無袋】6月中旬の薬剤散布 (前回より 10 日後)

散布時期	6月15日～20日		◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水	100ℓ	◆ 散布量 ℓ
	展着剤	20ml *注意事項④参照	
	ベルコートフロアブル	50ml (14日前、5回)	
	スプラサイド水和剤 ^劇	66g (21日前、2回) *注意事項③参照	
対象病害虫	黒斑病、黒星病、シンクイムシ類、カイガラムシ類、カメムシ類		
散布量	10a 当り：450ℓ以上		
注意事項	① 黒斑病対策：ロブドー水和剤 800 倍(14 日前、5 回)を加用する。 ② ハダニ類対策：カネマイトフロアブル 1,000 倍 (前日、1 回) を加用する。 ③ スプラサイド水和剤は劇物薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。 ④ 通常展着剤 (ハイテンパワー等) に代えて、固着性展着剤のアビオン E の 1,000 倍 (100ℓ当り 100ml) を使用すると、薬液付着効果が高まる。 ⑤ 無袋栽培の薬剤散布間隔は、今回から 7 月上旬 (第 10 回) まで概ね 10 日を進める。		

【無袋】6月下旬の薬剤散布 (前回より 10 日後)

散布時期	6月25日～30日		◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水	100ℓ	◆ 散布量 ℓ
	展着剤	20ml *注意事項①参照	
	アーデントフロアブル	50ml (前日、3回)	
	ロブドー水和剤	125g (14日前、5回)	
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類		
散布量	10a 当り：450ℓ以上		
注意事項	① 通常展着剤 (ハイテンパワー) に代えて、固着性展着剤のアビオン E の 1,000 倍 (100ℓ当り 100ml) を使用すると、薬液付着効果が高まる。		

(参考) 無袋第 7 月上旬の薬剤散布予定 : 7/5～10

◆ 西洋梨の定期防除は次頁をご覧ください。

● **西洋梨の定期防除**（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

輪紋病の最重要防除期間です。この期間に感染が進むと果実成熟期に多発します。予防効果を徹底してください。

【有袋】6月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	6月20日～25日頃	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水 1000 展着剤 10ml ダーズバンDF(劇) 33g (30日前、3回) *注意事項④参照 オキシラン水和剤 200g (3日前、9回)	◆ 散布量 リットル
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ	
散布量	10アール当たり：600リットル	
注意事項	① 袋掛け前に実施する。 ② 輪紋病対策：袋掛けが遅れた場合は、6月末にオキシラン水和剤500倍(3日前、9回)を特別散布する。散布時期は前回より10日後とする。 ③ ハダニ類対策：カネマイトフロアブル1,000倍(前日、1回)を加用する。 ④ ダーズバンDFは劇物薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。 ⑤ 有機銅成分を含む薬剤の使用回数は合計で9回以内であるので注意する。	

(参考) 西洋梨有袋7月上旬の薬剤散布予定：7/5～10（前回より概ね15日後）

【無袋】6月中旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	6月15～20日頃	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水 1000 当り ICボルドー412 3.3kg	◆ 散布量 リットル
対象病害虫	輪紋病	
散布量	10アール当たり：6000	
注意事項	① ICボルドーに代えて、オキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。 ② 葉やけ防止のため涼しい時間帯に散布する。	

【無袋】6月下旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	6月25～30日頃	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水 1000 当り ICボルドー412 3.3kg ダーズバンDF(劇) 33g (30日前、3回) *注意事項②参照	◆ 散布量 リットル
対象病害虫	輪紋病・シンクイムシ類・ハマキムシ類・クワコナカイガラムシ	
散布量	10アール当たり：6000	
注意事項	① ICボルドーに代えて、オキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。 ② ダーズバンDFは劇物薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。 ③ 葉やけ防止のため涼しい時間帯に散布する。	